


راهنمای تگهداری و مراقبت از

گربه



ترجمه و تالیف : دکتر علیرضا قمریان

با ۳۹ تصویر رنگی از نژادهای معروف گربه

قابل توجه خوانندگان محترم
جهت مشاوره و تعیین وقت معاينه حيوان خانگی خود
توسط
آقای دکتر علیرضا قمریان ، می توانید با
تلفن همراه ۰۹۰۱۰۲۷۳۷۰۰
تماس حاصل فرمایید .



راهنمای نگهداری و مراقبت

از

گربه

(به انسمام ۳۹ تصویر رنگی از نژادهای معروف گربه و معرفی کامل هر نژاد)

ترجمه و تأليف

دکتر علیرضا قمریان

قمریان، علیرضا، ۱۳۵۴ -

راهنمای نگهداری و مراقبت از گربه (به انضمام ۳۹ تصویر رنگی از نژادهای معروف گربه و معرفی کامل هر نژاد) / ترجمه و تألیف علیرضا قمریان؛ — تهران: قمریان، ۱۳۸۰.
۲۰۸ ص: مصور (بخشی رنگی).

ISBN : 978-964-96087-5-4

فهرستنویسی براساس اطلاعات فیبا.

چاپ قبلی: نوربخش، ۱۳۷۶.

۱. گربه‌ها — پرستاری و مراقبت. الف. عنوان.

۶۳۶/۸۰۸۳

۵۴۴۷/۲۸۲

۱۳۸۰

۱۲۱۶۷-۰۸۱۰

کتابخانه ملی ایران

راهنمای نگهداری و مراقبت از گربه

ترجمه و تالیف: دکتر علیرضا قمریان

ناشر: انتشارات قمریان (تلفن: ۰۶۹۱۵۴۶۰)

نوبت چاپ: هشتم ۱۳۹۳

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

حروفچینی و صفحه آرایی: موسسه بروجردی

لیتوگرافی: طاووس رایانه

چاپ: نقش طاووس

صحافی: سپیدار

قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال

ISBN : 978-964-96087-5-4

۹۷۸-۹۶۴-۹۶۰۸۷-۵-۴

فهرست مطالب

| عنوان | صفحه |
|-------|------|
|-------|------|

| | |
|----------|----|
| پیشگفتار | ۱۵ |
| مقدمه | ۱۷ |

فصل اول

راهنمای نگهداری گربه

| | |
|-----------------------------------|----|
| آناتومی گربه | ۲۰ |
| فیزیولوژی گربه | ۲۱ |
| انتخاب گربه به عنوان حیوان خانگی | ۲۲ |
| گربه؛ حیوان خانگی سالمندان | ۲۵ |
| معاینة گربه قبل از انتخاب | ۲۶ |
| روش معاینة گربه | ۲۷ |
| طرز تشخیص جنسیت بچه گربه | ۳۰ |
| ابزار مورد نیاز برای نگهداری گربه | ۳۱ |
| نکات ایمنی که باید رعایت شوند | ۳۲ |
| توصیه‌های ضروری برای صاحبان گربه | ۳۳ |
| مراقبت از بچه گربه | ۳۴ |
| مراحل رشد بچه گربه | ۳۵ |
| از شیر گرفتن بچه گربه | ۳۶ |
| مراقبت از بچه گربه‌های بی مادر | ۳۷ |
| روشهای غذا دادن به بچه گربه | ۳۸ |

| | |
|----|--|
| ۴۱ | نکاتی که در مورد بچه‌گریه‌ها باید به آنها توجه شود |
| ۴۲ | تعلیم و تربیت گریه |
| ۴۳ | تعلیم توالی رفتن |
| ۴۴ | تعلیم استفاده از بستر |
| ۴۵ | طریقه بلند کردن و نگهدارشتن گریه |
| ۴۷ | مسافرت با گریه |
| ۴۸ | لانه‌سازی برای گریه |
| ۵۰ | محل خواب گریه |
| ۵۰ | گردنبند |
| ۵۱ | سبد مسافرتی |
| ۵۲ | آشنا کردن گریه با لانه جدید آن |
| ۵۳ | نکاتی که قبل از خارج شدن از خانه باید مورد توجه قرار داد |
| ۵۳ | تفذیه |
| ۵۵ | نیازهای غذایی گریه |
| ۵۷ | غذاهای اصلی |
| ۵۸ | دفعات غذا دادن بر حسب سن گریه |
| ۵۹ | از دادن به گریه خودداری کنید |
| ۵۹ | نکات مهمی در مورد تغذیه گریه |
| ۶۰ | رسیدگی به وضعیت موها |
| ۶۰ | شانه زدن گریه‌های موبیلند |
| ۶۱ | روش شانه کردن |
| ۶۴ | ابزار مورد نیاز برای شانه کردن |
| ۶۴ | شانه زدن گریه‌های موكوتابه |
| ۶۵ | روش شانه کردن |

| | |
|----|--|
| ۶۷ | ابزار مورد نیاز برای شانه کردن |
| ۶۷ | مراقبت از ناخنها |
| ۶۸ | حمام کردن گربه |
| ۷۰ | زاد و ولد گربه‌ها |
| ۷۰ | آبستنی |
| ۷۰ | دوره آبستنی |
| ۷۰ | علایم آبستنی |
| ۷۱ | مراقبت از گربه آبستن |
| ۷۱ | فراهم کردن جعبه‌ای به عنوان محل ژایمان گربه |
| ۷۲ | جعبه مقواپی |
| ۷۲ | جعبه چوبی |
| ۷۲ | اقدامات پس از ژایمان |
| ۷۳ | موقعی که باید در طول ژایمان با دامپزشک تماس گرفت |
| ۷۳ | موقعی که باید پس از ژایمان با دامپزشک تماس گرفت |
| ۷۳ | باری رساندن به گربه‌ای که برای اولین بار ژایمان می‌کند |
| ۷۴ | آبستنی کاذب |
| ۷۵ | پیشگیری از آبستنی |
| ۷۵ | نکاتی که هنگام اخته کردن گربه ماده باید به آنها توجه کرد |
| ۷۶ | رفتارشناسی گربه |
| ۷۶ | هوش و ذکاوت |
| ۷۶ | استعداد گربه چقدر است؟ |
| ۷۷ | آیا گربه قابلیت یادگیری دارد؟ |
| ۷۷ | حافظه گربه |
| ۷۸ | گربه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ |

| | |
|----------|---|
| ۷۸ | آیا گربه‌ها هم حواس شش‌گانه دارند؟ |
| ۸۰ | شکار |
| ۸۰ | چرا گربه‌های اهلی شکار می‌کنند؟ |
| ۸۰ | گربه‌ها چه چیزهایی را صید می‌کنند؟ |
| ۸۱ | طرز برخورد شما با موجودی که گربه شکار کرده است؟ |
| ۸۱ | شکار پرندگان |
| ۸۱ | صید مگس |
| ۸۲ | رفتارهای اجتماعی گربه |
| ۸۳ | رفتارهای ضداجتماعی گربه |
| ۸۴ | تشخیص قلمرو فرمانتروایی گربه |
| ۸۵ | خواب |
| ۸۶ | وقتی یک گربه می‌خوابد، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ |

فصل دوم

مراقبت بهداشتی گربه

| | |
|----------|-----------------------|
| ۸۸ | علایم عمومی بیماری |
| ۸۹ | دستگاه تنفس |
| ۸۹ | طریقه عمل دستگاه تنفس |
| ۸۹ | اختلالات دستگاه تنفس |
| ۸۹ | سرفه |
| ۹۱ | نفس نفس زدن |
| ۹۳ | نفس کشیدن سطحی |
| ۹۴ | عطسه |
| ۹۵ | خس خس کردن |

| | |
|-----|----------------------------------|
| ۹۶ | آنفلانزا |
| ۹۷ | دستگاه گوارش |
| ۹۸ | نحوه فعالیت دستگاه گوارش |
| ۹۸ | اختلالات دستگاه گوارش |
| ۹۸ | بوی بد دهان |
| ۱۰۰ | بیوست |
| ۱۰۱ | تشنجی مفرط |
| ۱۰۲ | نفخ شکم |
| ۱۰۴ | کاهش اشتها |
| ۱۰۵ | پرخوری |
| ۱۰۷ | دندانها |
| ۱۰۷ | پیشگیری از پوسیدگی دندان |
| ۱۰۷ | تمیز کردن دندانها |
| ۱۰۸ | تورم روده گربه |
| ۱۰۸ | پیشگیری از تورم روده گربه |
| ۱۰۸ | راههای پیشگیری از بیماریهای روده |
| ۱۰۸ | انگلهاهای داخلی |
| ۱۰۹ | کرم گرد |
| ۱۰۹ | کرم شلاقی و کرم رشتمنی |
| ۱۱۰ | کرم قلابدار |
| ۱۱۰ | کرم نواری |
| ۱۱۰ | کرم‌های برگی‌شکل |
| ۱۱۱ | سایر انگلها |
| ۱۱۱ | راه درمان انگلها |

| | |
|-----|--------------------------------|
| ۱۱۲ | راههای پیشگیری از آلودگی انگلی |
| ۱۱۲ | چشم و گوش |
| ۱۱۲ | مراقبت از چشم |
| ۱۱۲ | عارض چشم و گوش |
| ۱۱۳ | بیرون زدنگی چشم |
| ۱۱۴ | ترشح مواد از چشم |
| ۱۱۵ | اختلال بینایی |
| ۱۱۷ | چشم درد |
| ۱۱۹ | کری |
| ۱۲۱ | ترشح مواد از گوش |
| ۱۲۲ | پیشگیری از بیماری‌های گوش |
| ۱۲۳ | استعمال پماد در چشم گربه |
| ۱۲۴ | مجرای ادراری |
| ۱۲۴ | اختلالات مجرای ادراری |
| ۱۲۴ | دفع غیرازدادی ادرار |
| ۱۲۶ | زور زدن |
| ۱۲۷ | پیشگیری از انسداد ادراری |
| ۱۲۸ | دستگاه تناسلی |
| ۱۲۸ | اختلالات تناسلی |
| ۱۲۸ | سقط جنین |
| ۱۲۹ | تاباروری |
| ۱۳۱ | درمان ورم پستان |
| ۱۳۲ | دستگاه عصبی |
| ۱۳۲ | اختلالات عصبی |

| | |
|-----|--------------------------------|
| ۱۳۲ | تلولو خوردن |
| ۱۳۳ | لرزه |
| ۱۳۴ | فلجی |
| ۱۳۵ | سیستم اسکلتی و عضلانی |
| ۱۳۶ | اختلالات سیستم اسکلتی و عضلانی |
| ۱۳۷ | لنگش |
| ۱۳۸ | تورم اندامهای حرکتی |
| ۱۳۹ | درمان پیچ خوردنگی |
| ۱۴۰ | پوست و مو |
| ۱۴۱ | مشکلات مربوط به پوست و مو |
| ۱۴۲ | اگزما |
| ۱۴۳ | ریزش مو |
| ۱۴۴ | عوارض پوست و مو |
| ۱۴۵ | عارض انگلهای خارجی |
| ۱۴۶ | آلودگی به کک |
| ۱۴۷ | آلودگی به شیش |
| ۱۴۸ | آلودگی به کنه |
| ۱۴۹ | آلودگی به جَرَب |
| ۱۵۰ | آلودگی به سایر جریها |
| ۱۵۱ | درمان آلودگی |
| ۱۵۲ | عفونتهای قارچی پوست |
| ۱۵۳ | بیماریهای غیرانگلی |
| ۱۵۴ | درمان بیماریهای غیرانگلی |
| ۱۵۵ | پیشگیری از آلودگی انسان |

| | |
|-----|--|
| ۱۴۷ | پرستاری از گربه مريض..... |
| ۱۴۷ | طريقة بلندکردن گربه مريض..... |
| ۱۴۷ | معاینه گربه نا آرام يا عصبي..... |
| ۱۴۹ | طريقة انتقال گربه آرام يا بيهوش..... |
| ۱۴۹ | طريقة قرص دادن به گربه..... |
| ۱۵۰ | خوراندن ماءات با قاشق به گربه..... |
| ۱۵۱ | زنونزها (بیماریهای مشترک)..... |
| ۱۵۲ | توکسوبلاسموز و راههای پیشگیری از آن..... |
| ۱۵۳ | هاري..... |

فصل سوم كمکهای اولیه

| | |
|-----|-------------------------------|
| ۱۵۶ | بیهوشی و تصادف..... |
| ۱۵۸ | لوازم ضروری کمکهای اولیه..... |
| ۱۵۹ | گرفتن درجه حرارت..... |
| ۱۶۱ | روش گرفتن نبض گربه..... |
| ۱۶۲ | تنفس مصنوعی..... |
| ۱۶۲ | روش خارجی..... |
| ۱۶۳ | روش دهان به دهان..... |
| ۱۶۳ | تشنج..... |
| ۱۶۴ | وجود جسم خارجی در دهان..... |
| ۱۶۵ | وجود جسم خارجی در چشم..... |
| ۱۶۵ | وجود جسم خارجی در بینی..... |
| ۱۶۵ | مسامومیت..... |

| | |
|-----|---|
| ۱۶۷ | جراحات و سوختگیها..... |
| ۱۶۸ | نکاتی که برای کنترل خونریزی می‌توان از آنها کمک گرفت..... |
| ۱۶۸ | درمان سوختگیها..... |
| ۱۷۰ | جراحات متداول..... |
| ۱۷۰ | باندаж..... |
| ۱۷۱ | بانداج یک چشم گربه..... |
| ۱۷۲ | بانداج جراحات ناحیه تنه گربه..... |
| ۱۷۲ | بانداج جراحات ناحیه دست و پا..... |
| ۱۷۲ | استفاده از آتل..... |

فصل چهارم نژادهای گربه

| | |
|-----|--|
| ۱۷۴ | گربه‌های موبلند..... |
| ۱۷۴ | گربه موبلند سیاه ایرانی..... |
| ۱۷۴ | گربه موبلند سفید ایرانی با چشمان آبی..... |
| ۱۷۵ | گربه موبلند سفید ایرانی با چشمان نازنجی..... |
| ۱۷۵ | گربه موبلند آبی رنگ ایرانی..... |
| ۱۷۶ | گربه موبلند قرمزنگ ایرانی..... |
| ۱۷۶ | گربه موبلند کرم‌رنگ ایرانی..... |
| ۱۷۷ | گربه موبلند دودی‌رنگ ایرانی..... |
| ۱۷۷ | گربه موبلند ایرانی با خطوط نقره‌ای..... |
| ۱۷۸ | گربه موبلند ایرانی دلای خطوط قهوه‌ای..... |
| ۱۷۸ | گربه موبلند ایرانی با خطوط قرمز..... |
| ۱۷۹ | گربه چین‌چیلای ایرانی..... |
| ۱۷۹ | تورتاویس شل (مخلوطی از سیاه و قرمز و کرم)..... |
| ۱۸۰ | تورتاویس شل موبلند و سفید..... |

| | |
|-----|---|
| ۱۸۰ | گربه موبلند دورنگ ایرانی |
| ۱۸۱ | گربه موبلند آبی - کرم ایرانی |
| ۱۸۱ | هیمالیایی (خمر) موبلند بالکه رنگی |
| ۱۸۲ | گربه برمهای |
| ۱۸۳ | گربه‌های موکوتاه |
| ۱۸۳ | گربه موکوتاه سفید اروپایی با چشمان آبی |
| ۱۸۳ | گربه موکوتاه سفید اروپایی با چشمان نارنجی |
| ۱۸۴ | گربه موکوتاه سیاه انگلیسی |
| ۱۸۴ | گربه موکوتاه آبی انگلیسی |
| ۱۸۴ | گربه آبی روسی |
| ۱۸۵ | گربه موکوتاه کرم انگلیسی |
| ۱۸۵ | گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط نقره‌ای |
| ۱۸۶ | گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط قرمز |
| ۱۸۶ | گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط قهوه‌ای |
| ۱۸۶ | تورتاوایش شل موکوتاه انگلیسی |
| ۱۸۷ | گربه انگلیسی تورتاوایش شل و سفید |
| ۱۸۷ | گربه سیامی |
| ۱۸۸ | گربه سیامی دارای خالهای آبی |
| ۱۸۸ | مانکس یا گربه مغولی |
| ۱۸۹ | گربه مغولی سیاه و سفید |
| ۱۸۹ | گربه مخطط خالدار اروپایی |
| ۱۸۹ | گربه آبی - کرم انگلیسی |
| ۱۹۰ | گربه قهوه‌ای - بلوطی هاوانا |
| ۱۹۰ | رکس آبی - کرم آلمانی |
| ۱۹۱ | رکس آبی انگلیسی |
| ۱۹۱ | اسفینکس آبی |

به نام او که هستی نام از او یافت،

مقدمه

خدای را سپاس که دل و دیده بندگانش را به فروغ جهان تاب دانش روشنی بخشید تا از تیرگی و تاریکی نادانی به روشنایی حقیقت و راستی روی آورند. ستایش خدای را که نویسنده را یاری کرد تا دومین کتاب خود را پیشکش دانشوران و مردم ایران کند؛ لیک آنگونه که گفته‌اند «برگ سبزی است تحفه درویش!» آری! ارمغانی خرد است؛ ولی امید دارد که مقبول افتاد.

نویسنده، پس از ترجمه کتاب نخست دریافت که دارندگان گربه نیز برای نگهداری بهداشتی و تیمار این جانور دوست داشتند، به کتابی در این زمینه نیازمندند. این نیاز و نیز حرمتی که گربه در میان انسانها دارد، نویسنده را بر آن داشت تا این کتاب را گرد آورد. حرمتی که از آن سخن رفت، با توجه به لطف و مهر ویژه پیامبر اکرم (ص) به این جانور بوده است؛ تا آنجاکه نیم خورده گربه یا ظرفی که لیسیده است در آین اسلام نجس نیست.

دکتر علیرضا قمریان

فهرست منابع

- 1) Encyclopedia of the cat/ Angela Sayer/1996
- 2) Cats: Their health and care/ Eddie Straiton/1991
- 3) You & your cat/ David Taylor/1990

۴- بخردی - حسن - نگرشی بر نژادهای معروف گربه - پایان‌نامه دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران - ۱۳۷۰

۱

راهنمای نگهداری گربه

آناتومی گربه

استخوانبندی گربه‌ها، به دلیل قابلیت انعطاف زیادی که دارد، انجام حرکات خاصی را برای آنها امکان‌پذیر می‌سازد. اسکلت گربه تقریباً از ۲۲۴ قطعه استخوان تشکیل شده‌است.

پاهای گربه امکان پرش تا ارتفاع ۲ متر را برای آن فراهم می‌آورند. دستها می‌توانند در هر جهتی چرخش داشته باشند. سرنیز می‌تواند بسرعت و بطور کامل در هر جهتی بچرخد. ستون فقرات گربه نسبت به سایر جانوران اهلی دارای قابلیت تحرک بیشتری است، چنانکه اگر کسی فقط به حرکت ماری شکل دم گربه نگاه کند متوجه انعطاف‌پذیری ستون فقرات این جانور خواهد شد. شباهت زیادی بین استخوانهای گربه و انسان وجود دارد که از آن جمله وجود دو استخوان ترقوه در اسکلت استخوانی گربه می‌باشد.

استخوانبندی بدن گربه توسط همان تعداد عضلاتی که در بدن انسان وجود دارد (بیش از ۵۰۰ عدد) به یکدیگر متصل شده‌اند، اما بسیاری از ماهیچه‌های گربه - بخصوص عضلات پا و ربع خلفی گردن - نسبت به ماهیچه‌های مشابه در انسان از قدرت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین هنگام شکار به گربه امکان جهش فوق العاده و حمله برق آسا می‌دهند.

گربه دارای قفسه سینه کوچکی است که قلب و ریه‌ها را در بر می‌گیرد. به دلیل کوچکی قفسه سینه و کاهش اندازه قلب و ریه در مقایسه با سگ زودتر خسته می‌شود، ولی گربه‌ها پس از یک دوره استراحت طولانی انرژی بیشتری جهت حرکتها را سریع به دست می‌آورند.

حفره شکم گربه همانند اغلب گوشتخواران وحشی از گنجایش کافی برای پرخوری برخوردار است و به همین جهت، گربه متعاقب پرخوری، تحمل گرسنگی را برای مدت طولانی خواهد داشت.

فیزیولوژی گربه

در گربه، مغزی تکامل یافته توازن ماهیچه‌ها و دستورات ارسالی از مغز را هماهنگ می‌کند و باعث عکس العمل سریع گربه می‌شود که از جمله نیازهای حیاتی آن برای موفقیت در امر شکار می‌باشد. گربه روی پنجه‌هایش راه می‌رود. تعداد پنجه‌های جلویی پنج و پنجه‌های عقبی چهار تاست. کف گوشتشی پای گربه پوشیده از گُرک است و این گُرک همراه انبوه پشم اطراف آن به گربه اجازه می‌دهد تا به هنگام شکار مخفیانه و بیصدا عمل کند. در عین حال پنجه‌ها از حساسیت فوق العاده‌ای برخوردارند. گربه همانند انسان از دستهایش برای بلند کردن غذا و اشیاء، احساس دما، ضربه زدن، نوازش کردن و غیره استفاده می‌کند. پنجه‌های عقبی بزرگتر و قویتر هستند و نیروی حرکة زیادی را برای پریدن و دویدن فراهم می‌کنند. سرپنجه‌های گربه هنگام جنگیدن و پنجول زدن نمایان می‌شوند. پنجه‌ها همچنین امکان محاکم چسبیدن به هر گونه سطحی را فراهم می‌آورند، مانند زمانی که گربه از درخت بالا می‌رود.



ناختها در بچه‌گریه قابلیت انقباض ندارند، اما پس از سه یا چهار ماهگی می‌توانند جمع شوند، ولی این جمع شدن در بعضی از گربه‌ها مانند گربه‌های سیامی کامل نیست.

اگر گربه بیشتر اوقات در خانه نگهداری می‌شود، بهتر است که ناخنهای آن بطور مرتب کوتاه شوند (طریقهٔ صحیح کوتاه کردن ناخنها بعداً گفته خواهد شد). دم گربه به تعادل جانور کمک می‌کند، اما شاید در گربه‌های اهلی وظيفةٔ فیزیولوژیکی آن نشاندهندهٔ حالات مختلف گربه باشد. وقتی نوک دم تکان می‌خورد، بیانگر وجود چیزی تازه و مهیج برای گربه است. حرکات شدید کل دم، نشاندهندهٔ عصبانیت می‌باشد. حرکات ملايم آن، خرسندی و رضایت گربه را نشان می‌دهد. یک حرکت شدید معمولاً بیانگر عصبانیت یا شگفت‌زدگی گربه می‌باشد. شاید مهمترین قسمت دستگاه حسی گربه، سبیلهای آن باشد. آنها نه تنها به بینایی گربه کمک می‌کنند، بلکه در تاریکی می‌توانند به جای چشم گربه کار کنند. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که گربه‌ها قادرند به وسیلهٔ تغییرات جزئی در فشار هوای اطراف سبیلهای خود به وجود اشیا پی‌برند.

ابروها هم عمل مشابهی دارند. علاوه بر اینها، موهای حساسی که در پشت مج دست گربه وجود دارند نیز همین کار را انجام می‌دهند. در حقیقت کل بدن گربه، بخصوص پشت گوشها و پایین ستون فقرات، بسیار حساس می‌باشد.

جز گربه‌های نژاد Sphynx، پوست سایر گربه‌ها توسط موهای پریشته (لطیفی) پوشیده می‌شود. این موها به عنوان عایقی در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل می‌کنند. مواد روغنی که از غدد چربی موجود در پوست گربه ترشح می‌شوند، جلای خاصی به موها می‌بخشنند.

غدد چربی با غدد عرق تفاوت دارند. غده‌های عرق، که شباهت به غدد عرق ما دارند، فقط بین قسمت گوشتی و کف پا یافت می‌شوند. گربه سالم نسبت به تمیزی



بسیار حساس است و بندرت اتفاق می‌افتد که بسوی نامطبوعی بدهد. گربه‌های عقیم حتی از این هم تمیزترند. گربه به وسیله زبان زمخت (زبر) خود که مانند شانه عمل می‌کند خودش را تمیز می‌کند.

زبری زبان گربه به علت وجود پردهای قوی و زیادی است که روی زبان قرار دارند و آن را به اندازه کافی خشن می‌کنند تا سطوح استخوانی را تراش بدهد.

متأسفانه شبی پردها به طرف عقب است و بنابراین هر چیزی که روی آنها قرار گیرد بلعیده می‌شود. این گفته بیانگر این است که چرا گربه‌ها بعضی از اشیاء تیز مثل سوزن را می‌بلعند. زبان گربه، به هنگام لیسیدن یا نوشیدن همانند قاشق عمل می‌کند.

انتخاب گربه به عنوان حیوان خانگی

گربه‌ها، بویژه نژادهای موکوتاه آن، در مقایسه با سایر جانوران به مراقبت کمتری نیاز دارند. گربه‌ها تمیز، پرتوان، دوست‌داشتنی، چالاک و مستقل هستند.

اگر شما سایر جنبه‌های شخصیتی گربه را نیز به ویژگیهای بالا بیفزایید، منصفانه خواهد بود که بگوییم گربه کاملترین حیوان اهلی خانگی می‌باشد. با این حال، گربه به تغذیه کامل و منظم نیاز دارد و اگر موهای بلندی دارد باید بطور منظم آن راشانه کرد.

اگر شما در مناطق خوش آب و هوای زندگی می‌کنید یا در خانه خود باغ دارید، گربه از ماندن در آنجا احساس لذت می‌کند. چنانچه در آپارتمان زندگی می‌کنید، گربه برای اینکه ملول و افسرده نشود به یک همدم و رفیق نیاز دارد.

اگر شما فردی عصبی هستید، گربه‌ای انتخاب کنید که طبیعتاً آرام است؛ مانند گربه ایرانی دارای خطوط نقره‌ای (Silver tabby).

اگر کار یا زندگی شما به گونه‌ای است که باید پیوسته در سفر باشید، گربه‌های خارجی مثل نژاد سیامی چشم‌آنی بهتر از گربه‌هایی هستند که از تغییر محل زندگی‌شان نفرت دارند.

اگر شما قصد از دیاد حیوان خانگی خود را ندارید، آن را عقیم کنید و هر چه سریعتر حیوان را در برابر تورم روده واکسینه نمایید. حداقل سن برای این کار، ۹ هفتگی است. بطور کلی، توصیه می‌شود که واکسیناسیون در ۹ هفتگی و اخته کردن در شش ماهگی صورت گیرد.

اگر بگذرید گربه نر شما باید آنکه اخته شود به سن بلوغ برسد، خانه شما پیوسته بودی حیوان نر را متصاعد می‌کند که باعث جلب توجه گربه‌های ماده خواهد شد. اگر گربه ماده‌تان را نیز عقیم نکنید، وقتی به سن شش ماهگی رسید، باید انتظار بچه گربه‌هایی را در خانه داشته باشید.

وقتی گربه خود را عقیم کردید، مراقب تغذیه آن باشید تا بیش از حد چاق نشود. آخرین نکته اگر در خانه بچه کوچک دارید، بهتر است گربه‌ای نگاه دارید که حداقل شش ماهه باشد و بتواند در مقابل بچه‌ها از خود مراقبت کند. گربه‌های کوچک، اگرچه دوست داشتنی و بازیگوش هستند، ولی اگر بطور نادرست

با آنها برخورد شود آسیبهای جدی خواهد دید.

گربه؛ حیوان خانگی سالمندان

تحقیقات پزشکی نشان داده است که حیوانات خانگی علاوه بر اینکه همدموی برای افراد سالمند می‌باشند باعث طول عمر آنها نیز می‌گردند. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، گربه حیوان ایده‌آلی است و مراقبت از آن آسان است. گربه برخلاف سگ به تمرينهای کنترل شده احتیاج ندارد. علاوه بر این، گربه مظهر آسایش مخصوصاً برای سالمندانی است که تنها زندگی می‌کنند.

گربه، به عنوان یک حیوان تکامل یافته و نیرومند، می‌تواند به صورت وحشی زندگی کند و این سرست مؤید آنست که گربه‌ها می‌توانند برای حفظ کنند. با وجود این، به منظور برقراری رابطه‌ای طولانی با گربه‌ها رعایت نکات زیر مفید به نظر می‌رسد.

- گربه را اخته کنید و بطور منظم در برابر بیماریهای روده‌ای کشنده واکسینه نمایید؛
- موهای گربه را حداقل روزی یکبار تمیز کنید. در مورد گربه‌های موبالند، این عمل را دو بار در روز انجام دهید؛
- اگر گربه شما بیشتر وقتی را در خانه سپری می‌کند، یک بستر خاکی برایش فراهم نمایید تا در آن ادرار یا مدفوع کند و روزانه آن را تمیز نمایید؛
- غذا دادن به گربه باید در زمان و مکان خاصی صورت گیرد و همیشه برای غذا دادن به گربه از ظرفهای تمیز استفاده کنید، زیرا گربه حیوان مشکل پستاندی است؛

- آب تمیز و تازه باید همیشه در دسترس گربه باشد. شیر ضروری نیست؛
- جای خواب راحت و گرمی برای گربه مهیا کنید و ترجیحاً آن را به وسیله روزنامه پوشانید و روزانه آن را عوض کنید؛
- گربه را در صورت نیاز برای معاینه یا درمان بیماریهای انگلی نزد دامپزشک ببرید؛
- اگر گربه خودش غذایش را شکار می‌کند هر شش ماه یکبار آن را نزد دامپزشک ببرید.

معاینه گربه قبل از انتخاب

قبل از انتخاب گربه به عنوان حیوان خانگی، به منظور اطمینان از سلامت آن، یکسری معاینات را انجام دهید. قبل از معاینه، دستان را بطور کامل بشویید. به منظور آرام کردن گربه، ابتدا کمی با آن بازی کنید. سپس گربه را محکم و ملایم بگیرید تا قادر به فرار نباشد. هر گونه حرکت ناگهانی ممکن است موجب وحشت گربه شود.

روش معاينة گربه



مو:

روی موی گربه دست
بکشید. موی گربه باید
صف و غیرنمدی باشد.
همچنین موی گربه را از
جهت آلوگی به کک و
سایر موجودات مودی
مورد بررسی قرار دهید.



گوش:

گوش بچه گربه باید تمیز و
خشک باشد. مطمئن
شوید که به وسیله چرک
مسدود نشده است.



چشمها و بینی :

بررسی کنید که پلک سوم
گویه بیرون زدگی نداشته
باشد، چشمها باید تمیز و
براق باشند. بینی هم باید
مرطوب باشد.



دهان و دندان :

گریه سالم دارای دهان
صورتی و دندانهای سفید
است. مراقب باشید که
لشهای متورم نباشند.




ناحیه مقدد :
دم گربه را بلند کنید و
ناحیه مقدد را به منظور
حضور علایم دال بر اسهال
مورد بررسی قرار دهید.



شکم :
با یک دستتان با آرامی ناحیه
زیر شکم گربه را لمس کنید.
این ناحیه باید گرد بوده و
soft نباشد. ناحیه بیرون زده
نشانه فتق می باشد. سپس به
بچه گربه اجازه دهید آزادانه در
اطراف شما حرکت کند تا اگر
شل است یا می لنگد متوجه
آن شوید.

طرز تشخیص جنسیت بچه گربه

اگرچه تشخیص جنسیت گربه‌های بالغ نسبتاً آسان است، تمایز بین بچه گربه‌های نر و ماده خیلی آسان نیست. برای تشخیص، دم بچه گربه را بلند کنید و سوراخ زیر مقعد را مورد توجه قرار دهید. در جنس ماده، سوراخ مهبل به مقعد بسیار نزدیک است و دو سوراخ ممکن است چسبیده به هم به نظر آیند؛ اما در جنس نر، یک ناحیه برآمده تیره‌رنگ وجود دارد که بیضه‌های حیوان می‌باشد و در زیر آن آلت تناسلی نر قرار دارد (به شکلها توجه کنید).



مراحل رشد بچه گربه

بیان رشد جسمی بچه گربه‌ها بیز متغیر است. بچه گربه‌هایی که می‌شوند هم رشد فردی متفاوت است. بعضی از بچه گربه‌ها نسبتاً سریعتر از مادرشان مستقل می‌شوند، در حالیکه بقیه براوی مدت بیشتری به مادرشان وابسته می‌مانند. علاوه بر این، منسلسل دارد:



- بیانی:
- بچشم‌ها در ۸-۲۰ روزگی باز می‌شوند.
- چشم‌ها در ۱۲ هفتگی شکل نهاییشان را می‌گیرند.



- حرکت:
- بچه گربه‌ها از ۱۶-۲۰ روزگی روی زمین می‌خونند.
- از ۲۱-۲۵ روزگی راه می‌روند.
- از ۴-۵ هفتگی قادر به دویدن می‌باشند.



- از شیرگرفتن:
- بچه گربه‌ها در ۳-۴ هفتگی پس از اولین بار مواد سفت می‌خورند.
- در ۸ هفتگی کاملاً از شیرگرفتن می‌شوند.



- تعلیم و تربیت:
- از ۴-۳ هفتگی نوالترفتن را بچه گربه بیاموزید.



- دندان در آوردن:
- در ۸ هفتگی عده دندانهای شیری در آمدند.
- دندانهای دائمی در ۱۲-۱۶ هفتگی ظاهر می‌شوند.



- بازیگری:
- بچه گربه‌ها از ۴ تا ۵ هفتگی شستشوی خودشان را باد می‌گیرند.
- از ۴-۵ هفتگی شروع به بازیگردان می‌کنند.
- از ۶-۸ هفتگی بصورت آزمایش شروع به شکارگردان می‌کنند.



- مراقبت‌های دامپردازی:
- در ۹ هفتگی اولین واکسن را دریافت کنند.
- دوسین واکسن را در ۱۲ هفتگی دریافت می‌کنند.
- ماده‌ها را در ۱۶ هفتگی عقیمه کنند.
- نرها را در ۲۶ هفتگی اخته کنند.



- استقلال:
- کشترین سنی که بچه گربه‌ها می‌توانند از مادرشان جدا شوند از ۸-۹ هفتگی می‌باشد.
- در ۶ ماهگی بطور کامل از مادرشان مستقل می‌شوند.

نکات ایمنی زیر را رعایت کنید

- هرگز در ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر یا اجاق را باز نگذارید.
- مطمئن شوید گیاهانی را که در خانه یا باغچه نگهداری می‌کنید سمی نیستند، زیرا بعضی از گیاهان برای گربه‌ها سمی هستند.
- طرف آشغال را دور از دسترس گربه نگهدارید.
- گاز خوراک‌پزی را دور از دسترس گربه قرار دهید.
- همیشه اشیای گرانبها را دور از دسترس گربه قرار دهید.
- اطراف شومینه حفاظت نصب کنید.
- به گربه اجازه جویدن سیم برق را ندهید و هنگامی که از وسایل برقی استفاده نمی‌کنید سیم آنها را از پریز بیرون بیاورید.
- وسایل تیز و برنده آشپزخانه را در دسترس گربه قرار ندهید.
- به گربه اجازه رفتن به آشپزخانه را ندهید.
- وسایل سمی را دور از دسترس گربه قرار دهید.
- وقتی در حال آشپزی هستید، به گربه اجازه ندهید به شما نزدیک شود.
- انوی داغ را دور از دسترس گربه قرار دهید.
- اجسام کوچک را در دسترس گربه قرار ندهید، زیرا ممکن است گربه آنها را ببلعد و خفه شود.
- به گربه اجازه رفتن روی بالکنهای مرتفع را ندهید.
- پاکتهای پلاستیکی را به حال خود رها نکنید، زیرا در صورتیکه گربه در آن گیر کند ممکن است خفه شود.

توصیه‌های ضروری برای صاحبان گربه


- به گربه در زمان معین و در ظرف خودش غذا بدهید. این ظرف را جدا از ظروف سایر اعضای خانواده نگهدارید.
- برای گربه محل خواب مخصوص به خودش فراهم کنید و به آن اجازه استفاده از رختخواب خودتان را ندهید.
- هر روز بستر خاکاره را که مخصوص توالت گربه است عوض کنید.
- اگر مایل نیستید بچه گربه شما زاد و ولد کند، با دامپزشک در مورد اخته کردن آن صحبت کنید.
- مطمئن شوید که گربه شما تمام واکسن‌های یادآور خود را تا زمان حاضر دریافت کرده است.
- اگر گربه شما موبلنده است، آن را بطور منظم شانه کنید و از لحاظ آلودگی به کک مورد بازرسی قرار دهید.
- در اولین فرصت ممکن، قوانین رفتاری را به گربه بیاموزید. اینکه بخواهید گربه‌ای را که به اسباب و اثاثیه خانه چنگ می‌زند و آنها را خراش می‌دهد چند روز پس از عمل از انجام این کار باز دارید؛ کار خوبی نیست.
- وقتی قصد رفتن به تعطیلات را دارید، مقدمات کار را طوری فراهم کنید تاکسی از مدتی قبل از حیوان خانگی شما مراقبت کند.
- در طول مراسمی مانند آتش‌بازی یا چهارشنبه‌سوری، گربه را داخل خانه محبوس کنید.

- اگر شما صاحب گربه جدیدی شدید یا اینکه محل زندگیتان را تغییر دادید، هرگز قبل از آشنایی با محیط، به گربه اجازه خروج از خانه را ندهید.
- اگر گربه ماده شما زایمان کرد، قبل از شش هفتگی بچه‌گریهای را از آن جدا نکنید.

مراقبت از بچه‌گربه

در ماههای نخست پس از تولد، بچه‌گربه خیلی دوست‌داشتنی است. با این حال، این دوره فوق العاده مهم است زیرا سلامتی جسمی - روانی گربه بالغ به همین دوره بستگی دارد. وقتی بچه‌گربه متولد می‌شود کور، کر و ناتوان است؛ اما پس از چند هفته به یک حیوان شکارچی تبدیل می‌شود. بنابراین در این دوره صاحب گربه باید آن را بدقست تحت نظر بگیرد و نیازهای آن را پیش‌بینی کند و علایم بیماری را تشخیص دهد.

ابزار مورد نیاز گربه



از شیر گرفتن بچه‌گربه‌ها

در بچه‌گربه‌ها، دندانها از سن دو هفتگی ظاهر می‌شوند. در سه هفتگی آنها به غذاهای سفت و جامد علاوه نشان می‌دهند. در شرایط طبیعی، بچه‌گربه‌ها در سن هشت هفتگی از شیر گرفته می‌شوند و از سه هفتگی به بعد بطور روزافزون در غذای مادرشان شریک می‌شوند.

اگر به هر دلیلی بچه‌گربه‌ها زودتر از شیر گرفته شدند، در سه هفته اول کمی غلات و گوشت خام چرخ شده همراه با شیر در اختیار آنها قرار دهید یا اینکه از چهار هفتگی به بعد تخم مرغ کاملاً پخته به آنها بدهید.

اگر به گربه در دفعات متعدد غذا دهید بهتر است. غذا دادن به گربه باید بر اساس اشتها و میل حیوان باشد و آنقدر به او غذا بدهید که بتواند همه آن را بخورد. مقدار و دفعات غذا دادن در طول روز در جدول زیر آمده است:

| سن | مقدار | تعداد دفعات |
|--------------|----------------|--|
| تا هفت روزگی | ۲-۶ میلی لیتر | هر ۲ ساعت یک بار |
| ۷-۱۴ روزگی | ۶-۸ میلی لیتر | هر ۲ ساعت یک بار در طول روز و |
| ۱۴-۲۱ روزگی | ۸-۱۰ میلی لیتر | هر ۴ ساعت یک بار در طول شب |
| | | هر دو ساعت یک بار در طول روز و یک بار هم بین ۱۱ شب و ۸ صبح |

یکی از بیماریهای گربه‌های مادر، تب شیر است که به دلیل کمبود کلسیم ناشی از شیر دادن به تعداد زیادی بچه‌گربه به وجود می‌آید. عالیم آن وقتی ظاهر

می‌شود که بچه گربه‌ها در سن سه تا هشت هفتگی هستند. در این هنگام، گربه مادر شروع به تلوتو خوردن می‌کند، می‌لرزد و بسختی نفس می‌کشد و اگر معالجه نشود قدرت پاهایش را از دست می‌دهد و به حالت اغما یا شوک می‌رود. در چنین مواردی، درجه حرارت بدنش ممکن است تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد بالا رود. در چنین حالتی، فوراً گربه را به کلینیک دامپزشکی منتقل کنید. دامپزشک فوراً بچه گربه‌ها را از مادر جدا خواهد کرد و به گربه مادر، با توجه به بروشور دارو، کلسیم داخل وریدی یا زیر پوستی تزریق می‌کند.


مراقبت از بچه گربه‌های بی‌مادر

بهترین راه نگهداری از بچه گربه‌های بی‌مادر، استفاده از دایه می‌باشد. این دایه لازم نیست که حتماً گربه باشد؛ بعضی از سگهای ماده بدون هیچ مشکلی به بچه گربه‌ها شیر می‌دهند. وقتی با مشکلی مواجه شدید با دامپزشک مشورت کنید، زیرا او بهتر می‌داند که کجا می‌توانید برای بچه گربه‌تان دایه پیدا کنید. مراقبت از اینگونه بچه گربه‌ها نیازمند صبر و برداباری زیاد می‌باشد. در ساعتهای اولیه، بچه گربه‌ها بیش از هر چیز دیگری به گرما نیاز دارند. این میزان در ۲۴ ساعت نخست، ۳۲ درجه سانتی‌گراد و در دو هفته بعد، ۲۷-۲۹ درجه سانتی‌گراد است. برای تأمین این درجه حرارت، می‌توانید از یک لامپ مادون قرمز استفاده کنید. بعد از دو هفته، درجه حرارت می‌تواند تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد تنزل یابد که همان درجه حرارت آناتق است. هضم شیر گاو برای بچه گربه‌ها سخت است. در این مورد، شیر خشک بچه با دو برابر غلظت که به آن هیدروکسید کلسیم اضافه شده است توصیه می‌شود. اگر هیچیک در دسترس نبود، بچه گربه را با فرمول زیر می‌توان تغذیه کرد: سه قسمت شیر گاو، یک قسمت هیدروکسید کلسیم، دو

قسمت روغن کبد ماهی، دو قاشق چایخوری گلوكز همراه با نصف قاشق چایخوری عصاره گوشت گاو. این مخلوط را به درجه حرارت بدن گریه یعنی ۳۸/۵ درجه سانتی گراد برسانید و هر سه ساعت یک بار به وسیله قطره چکان یا بطری پستانک دار آنها را تغذیه نمایید. شیر را بزور به بچه گربه ندهید؛ بگذارید خودش آن را بمکد. بعد از هر وعده غذا دادن، شکم بچه گربه را با حوله‌ای گرم، مرطوب و زیر مالش دهید. این عمل، سیستم گوارشی آنها را تحریک کرده و به ادرار کردن و حرکت روده کمک می‌کند.

روشهای غذا دادن به بچه گربه


برای غذا دادن به بچه گربه، سه وسیله معمولی وجود دارد: یکی قطره چکان و دیگری سرنگ دو سی سی است که یک لوله پنج سانتی‌متری به نوک آن وصل می‌شود، سومی هم بطری‌های پستانک دار می‌باشند.



روش غذا دادن

در مورد اکثر بچه گربه ها می توان از بطري پستانک دار استفاده کرد، اما در صورتی که قدرت مکیدن بچه گربه از پستانک ضعیف است از سرنگی استفاده کنید که لوله ای پنج سانتی متری به نوک آن وصل می شود و پس از عبور از پشت زبان و گلو، شیر را داخل معدة بچه گربه خالی می کند. این روش فقط باید با توصیه دامپزشک انجام شود. اگر اشتباه لوله در مجرای نای وارد شود، باعث خفگی بچه گربه خواهد شد. از هر روشی برای غذا دادن استفاده می کنید، ابتدا شیر را تا درجه حرارت بدن بچه گربه یعنی $38/5$ درجه سانتی گراد گرم کنید. برای گرم کردن شیر آن را با آب گرم مخلوط کنید و بگذارید تا سرد شود. سپس شیر را داخل بطري بريزيد و بگذاريد چند دقيقه در يك كاسه آب داغ بماند. قبل از شير دادن به بچه گربه، دمای شير را با ريختن کمي شير روی پشت دستتان آزمایش کنید تا نه گرم و نه سرد باشد. بطري باید مثل بطري بچه انسان کاملاً تمیز و بهداشتی باشد تا باعث عفونت در بچه گربه نشود. برای اين

منظور، در فواصل بین هر وعده غذا، بطري را بطور كامل بشوبيدو به وسیله موادي که برای سترون کردن بطري شير بچه ها فروخته می شود استريل کنيد. برای شير دادن به بچه گربه، آن را با قرار دادن دستتان بدor گردنش با آرامی بگيريد و سر



پستانک را وارد دهان بچه گربه نمایید. سعی کنید اين کارها را بي سر و صدا انجام دهيد تا بچه گربه وحشت نکند. سپس، با فشاری ملایم، بطري شير را وارد دهان بچه گربه نمایید.

نحوه از شیر گرفتن پس از پرورش طبیعی

| سن | غذا | روش غذا دادن |
|---------|--|--|
| ۳ هفتگی | شیر خشک را با آب رقیق اما غلظت آن دو برابر غلظت شیر بچه انسان باشد | روزی چهار بار به وسیله قاشق چایخوری به گربه غذا بدهید. |
| ۴ هفتگی | برای گربه مثل بالا شیر مهیا، کنید، علاوه بر این مقدار کمی پوره، غذای بچه کنسروشده مثل می خورد به آن غذا بدهید. | روزی چهار بار آن را داخل نعلبکی بrizید و در اختیار گربه قرار دهید. هر قدر گربه می خورد به آن غذا بدهید. |
| ۵ هفتگی | غذای گربه را به گوشتی که بخوبی ریز شده یا غذای کنسروشده مخصوص گربه که باز هم بخوبی خرد شده یا ماهی که در شیر پخته شده است تغییر دهید. یک وعده از چهار وعده را به غذای گفته شده اختصاص دهید | روزی یک بار غذای گفته شده را داخل نعلبکی بrizید و در اختیار گربه قرار دهید. هر قدر گربه می خورد به آن غذا بدهید. اما از دادن غذای بیش از حد در یک وعده خودداری کنید. |

نحوه از شیر گرفتن پس از پرورش طبیعی

| سن | غذا | روش غذا دادن |
|------------------|---|---|
| ۶-۸ هفتگی | به غذای گربه مقداری غذای مثل بالادر اختیار گربه قرار دهید. بتدریج خردشده جامد بیفزایید، ترجیحاً دو و عده از چهار و عده شیر بچه گربه را به غذای کامد تغییر دهید. گربه استفاده نمایید. | |
| ۸ هفتگی و بالاتر | بچه گربه ها بطور عادی از شیر گرفته می شوند. به آنها وعده غذای کامد و یک نعلبکی شیر گاو بدهید. وقتی گربه ۶ ماهه شد، می توانید آب را جانشین شیر کنید. | غذای کامد را در یک نعلبکی بگذارید. آب یا شیر باید همیشه در دسترس گربه باشد، اما آن را ۲-۳ بار عوض کنید. |

در مورد بچه گربه ها، به نکات زیر توجه کنید

- هرگز بچه گربه ها را با گرفتن پوست پشت گردنشان بلند نکنید.
- برای از بین بردن بچه گربه های ناخواسته آنها را عرق نکنید؛ از دامپزشک خود
بخواهید آنها را از بین ببرد.
- به بچه گربه هایی که تازه متولد شده اند شیر گاو ندهید.

- تا زمانی که بچه‌گربه‌ها حداقل به سن ۶ هفتگی نرسیده‌اند، آنها را از مادرشان جدا نکنید.
- قبل از تزریق اولین واکسن به بچه‌گربه، به آن اجازه خروج از خانه ندهید.

متوجه وزن بچه‌گربه‌ها نسبت به سن

| سن بر حسب روز | وزن بر حسب گرم |
|---------------|----------------|
| ۱ | ۷۰-۱۳۵ |
| ۵ | ۹۰-۲۲۰ |
| ۱۰ | ۱۲۰-۲۸۰ |
| ۱۵ | ۱۷۵-۲۲۵ |
| ۲۰ | ۲۱۰-۴۱۵ |
| ۲۵ | ۲۲۰-۴۸۰ |
| ۳۰ | ۲۶۰-۵۲۰ |
| ۳۵ | ۲۹۰-۶۲۰ |
| ۴۰ | ۳۰۵-۶۷۰ |
| ۴۵ | ۳۸۰-۷۶۵ |
| ۵۰ | ۳۹۰-۸۸۰ |

تعلیم و تربیت گربه

بهترین روش تربیت گربه این است که از ابتدای تولدش تربیت آن را آغاز کنید. تعلیم توالت رفتن را از هر وقتی که امکان دارد شروع کنید. در زمانهای معینی از روز به گربه غذا بدهید و آن را شانه کنید.

همه گربه‌ها باید یاد بگیرند که وقتی آنها را صدا می‌زنید جواب بدهند. اگر شما مکرراً نام گربه را به کار ببرید گربه نامش را یاد می‌گیرد و وقتی آن را صدا می‌کنید بخصوص در وقت غذا به شما جواب می‌دهد. علاوه بر این شما باید قادر باشید به گربه گردنبند بزنید. گربه ابتدا مانع از این عمل می‌شود، زیرا مایل نیست محدود شود. همچنین باید گربه را طوری تربیت کنید که وقتی در حال انجام کار نادرستی مثل گاز گرفتن و پریدن روی سایر افراد است با گفتن کلمه «نه» مانع از کارش شوید. بعضی از صاحبان گربه دوست دارند گربه آنها بعضی از حیله‌ها مثل خواهش کردن برای غذا را یاد بگیرند. این کار را می‌توان به وسیله دادن یک لقمه چرب و نرم یا نوازش کردن گربه انجام داد، اما گربه‌ها معمولاً کاری را که دوست دارند انجام می‌دهند و میزان تربیت نمی‌تواند آنها را وادار به انجام کاری کند که مایل به انجام آن نیستند.

تعلیم توالت رفتن

توالت رفتن را از زمانی که بچه گربه‌ها شروع به خوردن غذاهای جامد می‌کنند

يعنى در سه يا چهار هفتگی به آنها بیاموزید. بستری که به عنوان محل توالت گربه در نظر می‌گيريد باید در دسترس گربه باشد. این بستر باید در جای ساکت و آرامی قرار گيرد و بچه گربه‌ها را مکرراً بویژه وقتی آماده مدفوع يا ادرار کردن هستند يا در هنگام اين عمل روی بستر قرار دهيد. هر وقت بچه گربه قوز کرد و دمش را بالا گرفت، نشاندهنده اين است که گربه ادرار يا مدفوع دارد. اگر بچه گربه اشتباها در جايی غير از محل در نظر گرفته شده ادرار يا مدفوع کرد، محل را بخوبی بشويند؛ و گرنه بوی ساطع شده از آن محل باعث می‌شود گربه برای دفع مدفوع يا ادرار به آن محل بازگردد و آن محل را به عنوان محل دفع هميشگی خويش در نظر گيرد.

تعلیم استفاده از بستر

گربه‌ها طبیعتاً حیوانات تمیزی هستند، لذا تعلیم توالت رفتن به آنها کار نسبتاً



آسانی است، مخصوصاً زمانی که بچه گربه در کنار مادرش باشد. گربه‌های بی‌مادر براساس غریزه طبیعيشان مایلند مدفوع خود را پنهان کنند؛ بنابراین خيلي زود به بستر پرشده از خاک‌اره عادت می‌کنند. اگر بچه گربه از استفاده از بستر امتناع می‌ورزد، نسبت به محل بستر و تمیز بودن خاک‌اره آن تحقیق کنید. درصورتیکه بستر خاک‌اره بوی

ناخوشایندی ساطع کند، بچه گربه‌ها اکثرآ از آن استفاده نمی‌کنند. بستری که به وسیله خاک‌اره پر شده باشد، ساده‌ترین شکل توالت برای گربه‌هاست. اگر بيش از یك بچه گربه داريد، بستر را بزرگ‌تر انتخاب کنيد تا همه قادر به استفاده از آن باشنند.

طريقه بلند کردن و نگهداشتن گربه



بهترین روش بلند کردن گربه آبستن، گرفتن پس گردن آن با یک دست و قراردادن دست دیگر در زیر کپل آن است. با این کار، همه وزن گربه روی پوست پس گردن آن نمی‌افتد و گربه احساس راحتی می‌کند. گربه بالغ را می‌توان با قرار دادن یک دست در اطراف معده در نزدیکی دستهای حیوان و قراردادن دست دیگر در زیر کپل آن بلند کرد. در این حالت، گربه از نشستن روی آرنج شما احساس راحتی می‌کند.



۱ - وقتی می‌خواهید گربه را بلند کنید، یک دستتان را به دور معده و دست دیگر تان را زیر کپل آن قرار دهید.



۲ - گربه را بلند کنید و به سینه خود بچسبانید.
همیشه یک دستتان را زیر کپل گربه قرار دهید تا
کل وزن گربه روی آن قرار گیرد.



۳ - گربه را به خودتان تکیه دهید. از هر دو
دست خود برای نگهداری گربه استفاده کنید.



در مورد بچه گربه، آن را در کف دست بنشانید و
دست دیگر را زیر گردنش قرار دهید.

بهترین روش برای محاکم نگهداشتن گربه، گرفتن پس گردن آن می‌باشد. به منظور کنترل پنجه‌های آن، گربه را در زاویه آرنج خود بنشانید و پاهای عقبی آن را به وسیله همان دست بگیرید، درحالیکه پنجه‌های جلویش را به وسیله دست دیگر گرفته‌اید. اگر گربه غریب و وحشی است، ممکن است دستتان را گاز بگیرد؛ در این صورت هنگام بلندکردن آن درحالیکه شما پنجه‌های گربه را نگهداشته‌اید از شخصی بخواهید پس گردن آن را محکم بگیرد.

وقتی گربه را جهت تزریق برای دامپزشک نگه می‌دارید، خوب است که پوست گردن گربه را با یک دست بگیرید و با دست دیگر پشت حیوان را محکم به سمت پایین فشار دهید.

وقتی قصد دارید به گربه قرص یا شربت بدهید، از شخص دیگری کمک بگیرید تا گربه را در یک حوله بپیچد، به صورتی که فقط سر گربه بیرون باشد. بعد از هر نوع عمل جراحی، بهترین کار اینست که حداقل به مدت ده روز گربه را بلند نکنید، زیرا این عمل نه تنها به بهبود زخم کمک می‌کند و مانع از باز شدن بخیه‌ها می‌شود، بلکه مانع از وارد آمدن درد شدید به گربه می‌شود.

مسافرت با گربه

اکثر گربه‌ها از مسافرت بیزارند، بنابراین باید سفرهای خود را به حداقل تقلیل دهید. با وجود این اگر قصد داشتید گربه را نیز با خود به سفر ببرید، بهتر است که همیشه از یک سبد سریسته که دارای منافذ هوای می‌باشد استفاده کنید، زیرا وقتی گربه آزاد است ممکن است از پنجره به بیرون بپرد و علاوه بر این حواس راننده را پرت کند و باعث تصادف شود. قبل از مسافرت چیزهایی که باید برای گربه بردارید


عبارتند از : ۱ - بستر برای توالت گربه؛ ۲ - غذا؛ ۳ - آب؛ ۴ - ظرف غذا؛ ۵ - پتو؛ ۶ - اسباب بازی؛ و ۷ - سبد حمل و نقل.

می‌توانید قبل از مسافرت‌های طولانی به گربه داروی آرامی‌بخش بدهید. برای این کار، نیم یا یک ساعت قبل از مسافرت گربه را جهت تزریق دارو نزد دامپزشک ببرید. اثر داروی آرامی‌بخش تا هفت ساعت باقی می‌ماند. در مورد گربه‌هایی که مستعد ماشین‌گرفتگی هستند، از هشت ساعت قبل از مسافرت به گربه غذاندهید و حداقل از سه ساعت قبل از مسافرت مایعات هم به گربه ندهید. اگر گربه در طول مسافرت تنهاست، مقدار بیشتری داروی مسکن به گربه تزریق کنید تا مطمئن شوید حیوان در طول مسافرت در خواب خواهد بود.

لانه‌سازی برای گربه

گربه می‌تواند داخل یا خارج خانه سکنی گزیند. محیط ایده‌آل ترکیبی از این

دو است که دسترسی به دنیای مهیج بیرون و در عین حال پناهگاهی گرم و راحت را در داخل برای گربه تأمین می‌کند. اگر شرایط طوری است که گربه باید در یک آپارتمان



یا خانه‌ای در یک منطقه پر رفت و آمد شهر بدون هیچ‌گونه باعچه نگهداری شود، بخصوص اگر شما در طول روز خانه نیستید، بهتر است دو تا گربه داشته باشید تا

برای همدیگر همنشین باشند. گربه ممکن است قسمتی از داخل یا خارج خانه را به عنوان محل زندگی انتخاب کند، در این صورت برای این محل دری تعییه کنید. این در تنها شامل صفحه آویزانی است که از بالا لولا شده و گربه می‌تواند آن را از هر دو طرف هل دهد و باز کند. سنگینی در به صورت خودبخودی زبانه را بسته نگه می‌دارد و مانع از جریان هوا می‌شود.

برای اینکه بتوانید در موقع خاص مانند زمانی که گربه مریض است یا وقتی گربه ماده خود را عقیم نکرده‌اید و نمی‌خواهید در فصل جفتگیری از خانه خارج شود، مانع از بیرون رفتن گربه شوید، برای در محل سکونت آن چفتی تعییه کنید تا بتوانید در موقع گفته شده آن را قفل کنید.

گربه‌های بالغ خیلی سریع محل خواب مورد علاقه خود را پیدا می‌کنند. کاری که شما باید انجام دهید، تهیه یک سبد گرم می‌باشد که نیمی از سقف آن پوشیده است. جعبه چوبی که در خانه ساخته شود نیز برای این منظور مفید می‌باشد. بهترین بستر برای گربه روزنامه است، علاوه بر این روزنامه گرمترین ماده موجود می‌باشد و نیز ارزانترین و بهداشتی‌ترین وسیله قابل دسترسی است. روزی یک بار می‌توان روزنامه‌ها را عوض کرد و روزنامه‌های کثیف را سوزاند یا در سطل آشغال ریخت که با این کار مانع شیوع کک و شپش و غیره می‌شود.

برای بچه گربه‌هایی که تازه به خانه آورده‌اید، وسایل زیر مورد نیاز است:

- جعبه‌ای حاوی پوشال؛
- ظرف غذاخوری و آبخوری؛
- بستر گرم؛

سایر وسایل شامل گردنبند و اتیکت اسم جهت شناسایی گربه است. بستر جعبه‌هایی که به عنوان محل زندگی گربه در نظر گرفته می‌شوند، بهتر است مخلوطی از خاکاره و خزه باشد. روزنامه نیز به عنوان بستر مطرح است، اگرچه وجود یک لایه ضخیم روزنامه زیر بستر تمیز کردن آن را آسانتر می‌کند.

بستر را باید هر روز عوض کنید و سینی آن را با مواد شوینده غیرمحرك بطور كامل بشویید و با آب تمیز نمایید. هرگز از صابون یا مواد ضدغوفونی کننده بودار استفاده نکنید، زیرا در این صورت بچه گربه‌ها از سینی استفاده نخواهند کرد. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که تعدادی از صابونها و مواد ضدغوفونی کننده برای گربه‌ها مسموم کننده‌اند.


برای آبخوری و غذاخوری، باید ظروفی محکم با کف سنگین و لبه‌های باریک انتخاب شوند. نعلبکی برای این منظور مناسب نیست، زیرا وقتی بچه گربه گرسنه روی لبه آن لگد می‌گذارد بآسانی واژگون می‌شود. بسیاری از گربه‌ها غذا را از کاسه بیرون می‌ریزند، بنابراین بهتر است زیر ظرف غذای آنها یک ورق روزنامه پهن کنید.

محل خواب گربه

بچه گربه‌های نیز مانند گربه‌های بالغ به سبدهایی که نیمی از سقف آنها پوشیده است علاقه دارند و آنها را سریعتر به عنوان محل خواب بر می‌گزینند. تعدادی از بچه گربه‌ها هم محل خوابشان را روی کابینت آشپزخانه انتخاب می‌کنند. با این وجود هر جایی که بچه گربه مستقر شود، بستر آن باید هر روز تعویض گردد.

گردنبند

تا آنجا که ممکن است بچه گربه را زودتر به گردنبند عادت دهید، و گرنه



بچه گربه هر کاری را برای کندن آن انجام می‌دهد.

گردنبند ایده‌آل، باید دارای یک قسمت قابل ارتقای باشد تا در مواردی که گربه به هنگام راه رفتن به آن اویزان می‌شود باعث خفگی آن نگردد.

سبد مسافرتی

این سبد از لوازم ضروری می‌باشد، حتی اگر از آن فقط برای بردن بچه گربه نزد دامپزشک استفاده کنید، زیرا بارها دیده می‌شود وقتی بچه گربه به صورت آزاد در ماشین نزد دامپزشک برده می‌شود صاحبیش را چنگ زده است.

یک سبد ایده‌آل برای گربه، باید حداقل 305 میلی‌متر عرض، 455 میلی‌متر طول و 305 میلی‌متر ارتفاع داشته باشد. سبدی که در تصویر آمده ایده‌آل است.



آشنا کردن گربه با لانه جدید آن

وقتی گربه را در محیط جدید از سبد بیرون آوردید، آن را با رامی نوازش کنید و با آرامش با آن صحبت کنید.

گربه را با بستری که کف آن پوشیده شده است آشنا کنید و مقداری غذا، شیر یا آب به آن تعارف کنید. در این مدت باید همه درها بسته باشند. بچه گربه‌ها سریعتر از گربه‌های بالغ با محیط جدید آنس می‌گیرند، اما همه به دوره‌ای برای آشنایی با محیط جدید خود نیاز دارند. در طول این دوره، حداقل سه روز تمام راههای فرار را مسدود کنید.

اولین نشانه آنس گرفتن گربه با محیط جدیدش اینست که گربه شروع به شستشوی خودش می‌کند. علاوه بر این، نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید اینست که قبل از خرید گربه نر مطمئن شوید که حداقل یک ماه قبل اخته شده است، زیرا در غیر اینصورت بوی نامطبوعی از بستر حیوان ساطع می‌شود. اگر شما از قبل سگ یا گربه‌ای در خانه دارید، به حیوان تازهوارد حداقل یک روز وقت بدھید تا با محیط آشنا شود، سپس دو حیوان را با هم آشنا کنید. اگر عکس العمل‌های اولیه آنها خشن بود هراسی به خود راه ندهید.

پس از چند ساعت، حس کنجکاوی طبیعی آنها به علاوه میل غریزی‌شان برای دوست شدن، کارها را رو برآه می‌کند، مخصوصاً اگر شما خیلی با حیوان قبلی گرم بگیرید و گربه تازهوارد را کمتر مورد توجه قرار دهید. حسادت در حیوانات نیز مانند انسان خطرناک است.

قبل از خارج شدن از خانه نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

- آیا سینی بستر در دسترس گربه هست.
- غذای کافی در اختیار گربه قرار داده اید.
- آب تازه در دسترس گربه هست.
- درهایی که می خواهید بسته باشد بسته اید.
- دقیق هیچ خطری برای گربه وجود نداشته باشد.

تغذیه

مهتمترین قسمت نگهداری گربه، تغذیه آن می باشد. گربه ها جانورانی گوشتخوارند. گربه ها در حالت طبیعی به گوشت خام، استخوان و مواد گیاهی که در معدة شکار آنها وجود دارد علاقه نشان می دهند. گوشت مورد نیاز گربه می تواند گوشت قرمز، سفید، خام یا نیم پز باشد.

گوشت خام یا نیم پز که بخوبی خرد شده باشد، به همراه تکه هایی از سبزیجات نیم پز، کاهو، هویج و غیره مفید می باشند. گوشت، پروتئین مورد نیاز گربه را تأمین می نماید. سبزیجات، عناصر معدنی و ویتامینها بخصوص ویتامین A را که گربه قادر به سنتز آن نیست در اختیار گربه قرار می دهند. رژیم غذایی را می توان به وسیله نان یا غلات که تأمین کننده کربوهیدراتها می باشند متعادل ساخت، اما اینها نباید بخش اصلی غذا را تشکیل دهند.

منابع دیگر پروتئین، ماهی، پنیر و تخم مرغ می باشد. پروتئینها، اسیدهای

آمینه‌ای را که جهت ساخت و ایجاد بافت‌های بدن ضروری می‌باشد تأمین می‌نمایند، بنابراین برای رشد و ترمیم حیاتی هستند. حداقل باید ۱۰٪ جیره روزانه گربه‌های در حال رشد را پروتئین تشکیل دهد؛ درحالیکه در گربه‌های بالغ این مقدار به ۶٪ جیره روزانه تقلیل می‌باید. یک جیره کامل برای گربه‌ها حداقل باید حاوی ۲۵-۳۰ درصد پروتئین باشد تا گربه را سالم و قوی نگهدارد. فقط یک بار در هفته به گربه جگر بدھید. جگر خام مسهل است و شکل پخته آن ممکن است در گربه ایجاد یبوست نماید. طحال نیز باعث اسهال می‌شود و نباید بیش از دو بار در هفته به گربه داده شود.

بهتر است هم آب و هم شیر در دسترس گربه قرار دهید تا خودش انتخاب کند. همیشه گربه به آب آشامیدنی تمیز نیاز دارد و اینکه چقدر شیر می‌نوشد مهم نیست.

بسیار دیده می‌شود که گربه‌ها علف می‌خورند؛ علف خورده شده منبعی از ویتامینها و فیبر می‌باشد. علاوه‌براین، علف باعث استفراغ در گربه می‌شود و به بالا آوردن توode‌های پشم کمک می‌کند.

غذاهای خشک باعث ایجاد سنگ مثانه می‌شوند، بنابراین گوشت یا ماهی کنسروشده به علت اینکه آب بیشتری دارند برتر هستند. علاوه‌براین، شامل مواد معدنی و ویتامینها نیز می‌باشند. اگر فقط از غذاهای کنسروشده در تغذیه گربه‌ها استفاده می‌کنید، بهتر است که ویتامین B به جیره غذایی آنها بیفزایید، زیرا اکثر غذاهای کنسروشده از نظر این ویتامین دچار کمبودند.

توصیه می‌شود مقدار زیادی استخوان خام در اختیار گربه قرار دهید تا نیاز خود را به کلسیم و فسفر از این طریق تأمین نماید.

نیازهای غذایی گربه

| اجزای غذایی | میزان نیاز روزانه | منبع | توضیح |
|-------------|---|-------------------------------------|---|
| پروتئین | در مورد بچه گربه‌ها : ۴۵-۳۵٪ وزن کل جیره گربه‌های بالغ : ۲۵٪ وزن کل جیره | گوشت، تخم مرغ، ماهی، شیر، پنیر | نیاز گربه در این مورد بیش از سگ است (۱۳٪) |
| چربی | ۳۰-۲۵٪ وزن کل جیره | روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی | نیاز گربه در این مورد بیش از سگ است (۱۰-۵٪) |
| کربوهیدرات | تا ۳۳٪ وزن کل جیره | سیب‌زمینی، نان، غلات | ضروری نیست، اما برای اینکه روده‌ها خوب کار کنند مناسب است |
| ویتامین A | ۲۰۰۰ واحد بین‌المللی | شیر، روغن ماهی، هویج، تخم مرغ و جگر | مقدار زیاد آن می‌تواند خط‌آفرین باشد. بعنوان مکمل به جیره‌ها ضافه نکنید |
| ویتامین B2 | ۰/۵ میلی‌گرم | گوشت، مخمر، سبزیجات تازه و جگر | مقداری در روده گربه ساخته می‌شود. |
| ویتامین B6 | ۰/۳ میلی‌گرم | | برای گربه غیر ضروری است |
| ویتامین B12 | لازم نیست | | به وسیله گربه ساخته می‌شود |
| ویتامین C | لازم نیست | | غلات، بعضی از گوشت‌ها |
| ویتامین E | ۵ میلی‌گرم | | |

نیازهای غذایی گربه

| اجزای غذایی | میزان نیاز روزانه | منبع | توضیح |
|--------------|--|--|--|
| ویتامین D | ۱۵۰ واحد بین المللی | از تأثیر اشعه خورشید بر پوست ساخته می شود علاوه بر این در روغن ماهی شیر و تخم مرغ نیز وجود دارد. | مقدار زیاد آنها می تواند خطرآفرین باشد. بعنوان مکمل به جیره اضافه نکنید |
| ویتامین K | لازم نیست | به وسیله گربه ساخته می شود | مقداری در روده گربه سنتز می شود |
| بیوتین | ۰۰۵ میلی گرم | گوشت، سبزیجات تازه، مخمر، چگر | مقداری در روده گربه سنتز می شود |
| اسیدفولیک اب | ۰/۱ میلی گرم ۳۰ سی سی برای هر نیم کیلوگرم وزن بدن | | |
| عناصر معدنی | | | |
| سدیم | ۱۵۰۰ میلی گرم | جیره غذایی متعادل | مقدار زیاد آنها می تواند خطرآفرین باشد. هرگز بد صورت مکمل به جیره اضافه نکنید. گربه های مادر به مقدار بیشتری از آنها نیاز دارند. |
| پتاسیم | ۲۰۰ میلی گرم | | |
| کلسیم | ۴۰۰ میلی گرم | | |
| فسفر | ۴۰۰ میلی گرم | | |
| منزیم | ۱۰ میلی گرم | | |
| آهن | ۵ میلی گرم | | |
| مس | ۰/۲ میلی گرم | | |
| ید | ۰/۲ میلی گرم | | |
| منگنز | ۰/۲ میلی گرم | | |
| روی | ۰/۳ میلی گرم | | |
| کپالت | ۰/۲ میلی گرم | | |

غذاهای اصلی

| نوع | آماده سازی | ارزش غذایی | توضیحات |
|---|--|---|---|
| تولیدات پروتئینی خشک، نسبتاً مرتبط و کنسرتو شده | آماده استفاده می باشد و پختن لازم نیست | برای متعادل کردن جیره غذایی استفاده می شوند | پاسانی می توان از آن استفاده کرد |
| گوشت گوساله و بره | آن را بیزید یا کباب کنید، سپس به قطعات کوچک تبدیل نمایید | مملو از پروتئین می باشد | گوشت کهنه نخورد. اگر می خواهید گوشت را بیزید مثل آب گوشت باشد. |
| اما و احشا | باید همیشه آنها را بیزید | مملو از پروتئین می باشد | نباید کهنه و خراب باشند |
| گوشت پرنده و خرگوش | غذای پخته شده را تکه تکه کنید | مملو از پروتئین می باشد | با استخوان به گربه ندهید |
| شیر | آن را از بطیر خالی کنید | منبع خوبی از پروتئین و کلسیم است | در برخی از گربه ها ایجاد ناراحتی معدی می کند |
| پنیر | می توانید بصورت خام و رنده شده به گربه بدهید یا آن را با سایر غذاها طبخ کنید | منبع بالارزشی از پروتئین می باشد | |
| تخم مرغ | بصورت پخته و ریزشده یا بصورت خام در صورتی که سفیده آن را جدا کرده باشد به گربه بدهید | منبع خوبی از پروتئین می باشد | سفیده تخمر مرغ خام را به گربه ندهید در هفت تا بیش از دو تخم مرغ به گربه ندهید |
| سبزیجات | بصورت پخته به گوشت یا ماهی اضافه کنید. | هم حجم غذا را زیاد می کند و هم تأمین کننده ویتامین ها است | بیش از یک سوم غذا را تشکیل ندهد |

غذاهای اصلی

| نوع | آماده سازی | ارزش غذایی | توضیحات |
|------------------|--|---|--------------------------------------|
| ماهی | به صورت تازه و خام، دم پخت یا کباب شده به گربه بدهید. آن را تکه تکه کنید و استخوان آن را در بیاورید. | پروتئین بالایی دارد. روغن ماهی بدفعه توده مو از معدة گربه کمک می کند. | |
| میوه جات | گهگاه آن را تکه تکه کنید | منبعی از ویتامین های باشد | گاهی اوقات باعث لذید شدن غذا می شود. |
| غذاهای نشاسته ای | • نان برسته خردشده یا سیب زمینی را با آب گوشت یا ماهی مخلوط کنید. • غلات را می توانید با شیر استفاده کنید | حجم غذا را زیاد می کند | بیش از یک سوم حجم غذا را تشکیل ندهد |

دفعات غذا دادن بر حسب سن گربه

| سن | دفعات غذا دادن بر حسب گرم | مقدار غذا دادن در روز |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| ۳ ماهگی | ۴-۶ | ۸۰-۱۹۰ |
| ۴-۵ ماهگی | ۴-۵ | ۲۷۵ |
| ۶-۷ ماهگی | ۳-۴ | ۳۷۰ |
| ۷-۸ ماهگی | ۳ | ۳۷۰ |
| گربه های بالغ | | |
| بیش از ۹ ماهگی | ۲-۳ | ۴۰۰ |
| گربه های آستان | ۳-۵ | ۴۲۰-۴۶۰ |
| گربه های شهری بزرگ | ۳-۶ | ۳۰۰-۳۷۰ |

از دادن مواد زیر به گربه خودداری کنید

- گوشت‌های کهنه و فاسد، چون ممکن است مملو از باکتری باشد؛
- استخوانهای کوچک مرغ، زیرا باعث خفگی گربه می‌شود؛
- سفیده تخم مرغ خام، زیرا شامل ماده‌ای شیمیایی به نام آویدین است که با بیوتین که یک ویتامین ضروری است ترکیب می‌شود و آن را برای گربه غیر قابل استفاده می‌سازد؛
- بیش از دو تخم مرغ در هفته؛
- غذای خشک، به گربه‌ای که دارای مشکلات مثانه است ندهید؛
- ماهی پخته، زیرا پختن باعث از بین رفتن مواد غذایی ماهی می‌شود.

نکات مهمی در مورد تغذیه

- اگر اشتهاي گربه افزایش یافته‌است، یا مقدار غذای هر دفعه را بیشتر کنید یا تعداد دفعات غذا دادن را افزایش دهید.
- برای گربه غذایی با پروتئین بالا مانند ماهی، گوشت و مرغ تدارک ببینید. علاوه براین، انواع مختلف سبزیجات و میوه در اختیار آن قرار دهید.
- در موقع تشنجی، به قدر نیاز آب یا شیر در اختیار حیوان قرار دهید، چراکه منع مصرف این ترکیبات در چنین شرایطی خطرناک است.

- یک قاشق چایخوری روغن به جیره اضافه نمایید تا کالری مورد نیاز حیوانات مسن و لاگر که قادر به جذب مواد غذایی نیستند تأمین شود.
- گهگاه پارافین مایع به جیره غذایی بیفزایید تا مانع از یبوست شود.
- سبوس و روغن ماهی می‌توانند در پیشگیری از یبوست مفید باشند.

رسیدگی به وضعیت موها

همانطوری که قبل اگفته شد، گربه‌ها حیوانات تمیزی هستند و چندین ساعت از روز را صرف تمیز کردن خود می‌کنند. زبان گربه‌ها دارای سطح زبری است و بهتر از هر شانه و برسی عمل می‌کند.

زبان گربه به تمامی قسمتهای بدن بغیر از سر، شانه‌ها و پشت گردن می‌رسد. به هر صورت، این نواحی نیز به وسیله پنجه‌های گربه تمیز می‌شوند. با این وجود، برای اینکه از پراکنده شدن موی حیوان روی اسباب و اثاثیه خانه خلاص شوید، روزانه آنها را شانه بزنید.

شانه زدن گربه‌های موبلند

در عالم وحش، گربه موبلند فقط در زمستان موریزی داشت، اما پس از اینکه گربه اهلی شد و محل زندگی آن از لحاظ گرما و نور تغییر کرد، موریزی در طول سال اتفاق می‌افتد. درنتیجه، گربه‌های موبلند باید روزانه شانه شوند، و گرنه موی آنها نمدی خواهد شد. اگر موهای نمدی شده را در مراحل اولیه از هم باز نکنید،

در دنک خواهد شد و شما مجبور خواهید بود گربه را به کلینیک دامپزشکی ببرید تا تحت شرایط بیهوشی موهای گربه کوتاه شود. اگرچه انجام این کار برای گربه در دنک نیست، اما هزینه برمی‌دارد. قبل از اینکه شروع به شانه کردن گربه نمایید، ابتدا گوش، چشم، دهان و ناخن‌های گربه را مورد بازررسی قرار دهید تا تمیز باشند و علایم بیماری در آنها قابل روئیت نباشد.

روش شانه کردن



۱ - به وسیله شانه‌ای که دندانه‌ها یش از هم فاصله دارند، خردکهای آشغال را از موی گربه خارج کنید.



۲ - از یک برس سیمی برای خارج کردن موهای مرده استفاده کنید. توجه خاصی را به ناحیه کپل گربه مبدول دارید، می‌توانید به وسیله دستتان آنها را تمیز کنید.



۳ - مقداری پودر بچه لابلای موهای گربه بریزید. این کار باعث جداشدن موها از هم می‌شود و می‌توانید به سرعت آنها را شانه کنید.



۴ - شانه‌ای با دندانه‌های نرم از داخل مو به سمت بالا حرکت دهید و موهای اطراف گردن را شانه بزنید. آنچنانکه به شکل یقه گرد شود.



۵ - به وسیله یک مسوак، موهای کوتاه صورت گربه را شانه بزنید.
مسواک را به چشم گربه نزدیک نکنید.



۶ - سرانجام از مرحله چهار به بعد را با یک شانه دندانه باز تکرار کنید تا موها را از هم جدا کرده و به سیخ ایستادن آنها کمک کند.



شانه زدن گربه های موکوتاه

گربه موکوتاه به شانه کردن روزانه نیاز ندارد، درنتیجه نگهداری آن نسبت به گربه موبلند آسانتر است. علاوه بر این، گربه های موکوتاه نسبت به گربه های موبلند زبان بلندتری دارند که در شانه کردن خودشان کارآیی دارد. دو جلسه نیم ساعته در هفته برای شانه کردن این گربه ها کافیست.

روش شانه کردن



۱ - به وسیله یک شانه فلزی دندانه ریز از سرتادم گربه را شانه کنید. در هنگام شانه کردن، گربه را از لحاظ آلوگی به کک و غیره معاینه کنید.



۲ - از یک برس لاستیکی برای شانه زدن موها در جهت خم آنها استفاده کنید.



۳ - در مورد بعضی از گربه های مو کوتاه، ممکن است شما ترجیح دهید از یک برس مویی به جای برس لاستیکی استفاده کنید. موها را دوباره در جهت خواب آنها شانه بزنید.



۴ - بعد از اینکه شانه کردن و
برس زدن تمام شد، روی موی گربه
دست بکشید. این کار باعث خروج
چربی از غدد مریبوطه می شود و به
درخشنندگی مو کمک می کند.



۵ - سرانجام برای
درخشنندگی بیشتر موها
می توانید از تکه‌ای
پارچه ابریشمی، مخمل
یا چرم استفاده کنید. از
یک جلسه شانه کردن تا
جلسه بعد می توانید
برای حفظ درخشنندگی
موها با دست تمیز در
جهت خمی موها روی
آنها بکشید.

ابزار مورد نیاز برای شانه کردن گربه های مو بلند



مراقبت از ناخنها

در گربه سالم و فعال، وقتی گربه بازی می کند، ناخنها به صورت خودبخودی کوتاه می شوند؛ اما اگر گربه شما پیر است یا اینکه در خانه محبوس شده، شما باید بطور منظم ناخنهای آن را مورد بررسی قرار دهید تا اگر لازم است آنها را کوتاه کنید. اگر ناخن کوتاه نشود، در گوشت پا فرو رفته و به دخالت های دامپزشکی نیاز می یابد.

کوتاه کردن ناخنها

اگر لازم است که ناخنها گربه را کوتاه کنید، حیوان را محکم در آغوش بگیرید

و با انگشتهایتان کف پنجه‌اش را فشار دهید تا ناخنهاش بیرون بیایند. بدقت ناخنها را بررسی کنید. قسمت صورتی ناخن شامل رگ و عصب است، درنتیجه بریدن آن باعث خونریزی و درد شدید می‌شود. شما باید مراقب باشید که این قسمت را نبرید. قسمت سفید ناخن بافت مرده است، درنتیجه بریدن آن دردی ندارد.

ناخن‌ای گربه
بندرت کشیف می‌شوند،



اما اگر کشیف شدند شما می‌توانید با استفاده از یک تکه کتان مرطوب آنها را تمیز کنید. برای کوتاه کردن ناخن می‌توانید از قیچیهای خیلی تیز یا ناخنگیرهای مخصوص استفاده کنید. مراقب باشید گوشت زیر ناخن را نگیرید.

حمام کردن گربه

ظرفشویی آشپزخانه، بهترین محل حمام گرفتن گربه است. قبل از اینکه

شروع به حمام کردن گربه کنید، مطمئن شوید که همه درها و پنجره‌ها را بسته‌اید و اتاق سرد نیست. یک تکه روکش لاستیکی داخل ظرفشویی قرار دهید تا مانع سرخوردن گربه شود. اگر فکر می‌کنید که گربه شما تقلا می‌کند، آن را داخل یک کیسه کتانی قرار دهید بطوری که فقط سرش بیرون باشد. شامپو را داخل کیسه بریزید و گربه را درحالیکه داخل کیسه است زیر آب کنید. گربه را از طریق کیسه ماساژ دهید.



- ظرفشویی را حدود ۱۰-۱۵ سانتی‌متر از آب پر کنید. درجه حرارت آب باید نزدیک درجه حرارت بدن گربه یعنی ۳۸/۵ درجه سانتی‌گراد باشد. برای بلند کردن گربه یک دست خود را زیر کپل گربه قرار دهید و با دست دیگر خود پس گردن گربه را بگیرید.
- از یک اسفنجه برای شستن تمام قسمتهای بدن گربه بغیر از سر آن استفاده کنید، بعداً مقداری شامپوی بچه روی موی گربه بریزید تاکف کنند. وقتی کل بدن گربه کفی شد، آن را با آب گرم بطور کامل بشویید تا دیگر هیچ اثری از کف در آب نماند.
- گربه را از ظرفشویی خارج کنید و در یک حولة بزرگ و گرم بپیچید. حالا می‌توانید صورت آن را به وسیله حولة کتانی که در آب گرم خیس خورده بشویید. تا زمانی که گربه کاملاً خشک نشده، آن را در جای گرم نگهدارید. اگر گربه از ششوار نمی‌ترسد، می‌توانید از آن برای خشک کردن گربه استفاده کنید، ولی باید دقیقاً که درجه حرارت ششوار کم باشد تا باعث سوختگی موهای گربه نشود. وقتی موی گربه خشک شد آن را با آرامی شانه کنید.

زاد و ولد گربه‌ها

آبستنی

اگر جفتگیری گربه موفقیت‌آمیز باشد، گربه ماده دیگر علایم فحلی را نشان نمی‌دهد و بزودی علایم آبستنی بروز خواهد کرد؛ اما اگر گربه آبستن نشده باشد، فحلی دو تا سه هفته بعد تکرار خواهد شد. طول مدت آبستنی حدود ۶۵ روز می‌باشد.

دوره آبستنی

در حالت طبیعی، دوره آبستنی گربه ۶۵ روز است، هرچند ممکن است چند روز بیشتر به طول انجامد. اگر گربه سالم است نگرانی موردندارد، اما در صورتیکه گربه ناسالم و رنگ پریده است آن را فوراً به کلینیک دامپزشکی منتقل کنید. در اکثر موارد زایمان باسانی انجام می‌گیرد.

علایم آبستنی

- قرمز شدن سر پستانها که در سومین هفتة آبستنی اتفاق می‌افتد؛
- افزایش تدریجی وزن به میزان ۱-۲ کیلوگرم که بستگی به تعداد بچه

گربه‌ها دارد؛

- متورم شدن شکم (هرگز برای لمس جنین، شکم گربه را فشار ندهید، زیرا این کار باعث صدمات جدی به جنین خواهد شد)؛
- تغییر رفتار گربه و بروز رفتار مادری.

مراقبت از گربه آبستن

در مراحل اولیه آبستنی، هیچ‌گونه مراقبت خاص یا جیره ویژه‌ای برای اینگونه حیوانات لازم نیست؛ اما وقتی بچه گربه‌ها در رحم رشد می‌کنند، اشتهاي گربه مادر افزایش می‌یابد. در این مرحله، غذاهای پرتوئینی بخصوص گوشت ارجحیت دارند. کربوهیدرات‌زیاد گربه را چاق و درنتیجه زایمان را مشکل می‌کند. می‌توان به گربه آبستن قرصهای ویتامین یا کلسیم داد، اما اگر تغذیه گربه آبستن کامل باشد نیازی به آن نیست.

فراهرم‌کردن جعبه‌ای به عنوان محل زایمان گربه


دو هفته مانده به زایمان، گربه را در خانه محبوس کنید و جعبه‌ای را به عنوان محل زایمان گربه تدارک ببینید. جعبه را باید در جای گرم و آرام قرار دهید. کف جعبه را به وسیله پارچه کتانی یا روزنامه بپوشانید. در این مورد روزنامه ارجحیت دارد، زیرا عایق خوبی است و در صورت کشیف شدن می‌توان آن را براحتی تعویض کرد.

یک لامپ مادون قرمز در فاصله یک متری بالای جعبه آویزان کنید. وقتی جعبه آماده شد، گربه را به سمت جعبه هدایت کنید. اگر گربه جای دیگری را برای زایمان انتخاب کرد، جعبه را به آنجا انتقال دهید. اگر گربه از جعبه‌ای که برای آن

مهیا کرده‌اید امتناع می‌ورزد، رختخواب گربه را به محل مورد علاقه‌اش انتقال دهید و یک لامپ مادون قرمز بالای آن آویزان کنید.

جعبه مقوایی

اگر گربه شما جای دنجی را انتخاب کرده است، یک جعبه مقوایی روباز قابل استفاده می‌باشد. جعبه را پس از زایمان دور بیندازید.



جعبه چوبی

این جعبه مکعبی ۵۰ سانتیمتری، دارای دری ۱۵ سانتیمتری و سقفی متحرک می‌باشد تا گرمای لامپ مادون قرمز به پایین انتقال یابد. بعد از استفاده، جعبه را ضدغوفنی کنید.

اقدامات پس از زایمان

- به محض اتمام زایمان، محل خواب گربه را تغییر کنید؛
- جیره غذایی کاملاً متعادل و باکیفیت بالا برای گربه مهیا کنید؛
- روزانه ۲۰۰ میلی‌گرم لاکتات کلسیم، گلوکونات کلسیم یا استخوان فاقد آلودگی به گربه بدھید؛
- به غذای روزانه گربه، مولتی‌ویتامین مخصوص بچه یا مخصوص حیوانات خانگی اضافه کنید؛

- گربه را تا ۳-۴ روز داخل خانه نگهدارید، اما بچه‌گربه‌ها را تا پایان دوره شیرخوارگی در خانه نگهدارید.

موقعی که باید در طول زایمان با دامپزشک تماس گرفت

- وقتی گربه به مدت دو ساعت برای زایمان زور می‌زند، ولی بچه‌گربه‌ای نزاییده است؛
- وقتی پس از گذشتن شش ساعت از خروج خون و سایر مواد ترشحی رنگی از مهبل، زایمانی صورت نگرفته است؛
- اگر علیرغم باقی ماندن بچه‌گربه در شکم، زایمان برای مدتی بیش از دو ساعت دچار وقفه شود.

موقعی که پس از زایمان باید با دامپزشک تماس گرفت


- اگر گربه از مهبلش خونریزی شدید دارد؛
- اگر ترشحات مهبلی بدبو، سفید یا رنگی ظاهر شود؛
- اگر گربه بیحال و گرفته به نظر می‌رسد؛
- اگر تغذیه گربه بعد از ۱۲ ساعت به حالت عادی برنگشت؛
- اگر هنوز گربه در حال زور زدن است؛
- اگر گربه بیقراری می‌کند؛
- اگر گربه تب دارد؛
- اگر گربه به بچه‌هایش علاوه نشان نمی‌دهد.

یاری رساندن به گربه‌ای که برای اولین بار زایمان می‌کند

گاهی اوقات گربه‌ای که برای اولین بار زایمان می‌کند، پس از زایمان بچه‌های خود را نمی‌لیسد، پردههای غشایی اطراف آنها را در محل مربوطه پاره نمی‌کند یا


اینکه بند ناف را نمی‌بُرد. در چنین مواردی شما باید فوراً دخالت کنید و گرنه بچه گربه‌ها فوراً خواهند مُرد:

- ۱ - اگر پرده‌های غشایی هنوز دور بچه گربه‌ها را احاطه کرده‌اند، آنها را پاره کنید.
- ۲ - آنها را به وسیله یک حولة‌گرم خشک کنید. توجه خاصی به سوراخهای بینی آنها مبذول دارید تا مخاطاتی که راههای هوایی را مسدود کرده‌اند خارج شوند.



۳ - وقتی بچه گربه شروع به تنفس کرد، جیغ ضعیفی می‌زند و کمی حرکت می‌کند. شما باید مراقب بند ناف باشید. کمی کتان محکم و یک قیچی کاملاً استریل آماده کنید. کتان را محکم، در سه سانتی‌متری ناف، اطراف بند ناف ببندید.

- ۴ - کتان را گره بزنید و سپس نیم سانتی‌متری زیر گره را ببرید
- ۵ - درنهایت، بچه گربه‌ها را درون جعبه زیر نور مادون قرمز قرار دهید.



آبستنی کاذب

تعدادی از گربه‌ها، اگر چه سابقه جفتگیری نداشته باشند، به آبستنی کاذب مبتلا می‌شوند. این گربه‌ها تمامی علایم آبستنی را نشان می‌دهند. شکم آنها باد

می‌کند، شیر در پستانهای آنها جمع می‌شود، لانه‌سازی می‌کنند و غیره؛ ولی پس از ۶۵ روز، بدون اینکه بچه‌گربه‌ای متولد شود، به حالت عادی بر می‌گردند. دامپزشک در این مورد اقدامات مفیدی انجام می‌دهد، زیرا اگر شیر جمع شده در پستانه خارج نشود، گربه به بیماری ورم پستان مبتلا می‌شود.

پیشگیری از آبستنی

اگر مایل به تکثیر حیوان خانگی خود نیستید به یکی از روش‌های زیر مانع آبستن شدن آن شوید:

- ۱ - اخته کردن گربه نر؛
- ۲ - اخته کردن گربه ماده؛
- ۳ - استفاده از قرصهای ضدبارداری

نکاتی که هنگام اخته کردن گربه ماده باید به آنها توجه کرد

- گربه را قبل از سه ماهگی اخته نکنید؛
- در طول دوره فحلی از اخته کردن گربه خودداری کنید، زیرا سطح بالای هورمونهای جنسی در خون باعث افزایش خونریزی خواهد شد؛
- گربه را بعد از چهار هفتگی آبستنی نباید عقیم کرد. دامپزشکان اکثراً از عقیم کردن گربه آبستن امتناع می‌ورزند، مگر در حالتی که لگنچه بطور مادرزادی بدشکل گرفته باشد.

رفتار شناسی گربه

درک حالات و انگیزه‌های سایر افراد، حتی وقتی همگی دارای زبان مشترکی باشیم نیز بآسانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین با توجه به مطلب گفته‌شده این نکته مشخص می‌شود که درک رفتار سایر موجودات چقدر مشکل است. با توجه به اینکه بین انسان و گربه زبان مشترکی وجود ندارد و حتی این امکان هم فراهم نیست که دنیای گربه را مورد تجربه قرار دهیم، این کار ناعاقلانه است که رفتار گربه را مانند انسان کوچکی که دارای سبیل و چنگال است تفسیر کنیم. گربه از لحاظ حالات و گرایشات و رفتارهای اجتماعی کاملاً با انسان فرق دارد.

هوش و ذکاوت

گربه حیوان فوق العاده زیرکی است و دنیای اطرافش را کاملاً درک می‌کند. گربه قادر است مشکلات خود را حل نماید و خود را با شرایط مختلف وفق دهد.

استعداد گربه چقدر است؟

متداولترین معیار برای اندازه‌گیری استعداد حیوانات، مقایسه وزن مغز نسبت به طول نخاع می‌باشد. این معیار به ما نشان می‌دهد که چه مقدار از ماده

خاکستری مغز چه میزان از بدن را کنترل می‌کند. این نسبت در گربه ۴ به ۱، در حالیکه در میمون ۱۸ به ۱ و در انسان ۵۰ به ۱ می‌باشد.

آیا گربه قابلیت یادگیری دارد؟

عمل شکار در گربه‌سانان غریزی نیست، بلکه آنها این کار را از سایر گربه‌ها یاد می‌گیرند. چنانچه بچه گربه‌ها از مادرهایی متولد شوند که شکار نمی‌کنند، شکار کردن را یاد نخواهند گرفت. رفتارهای دیگر مانند استفاده از بستر را هم از مادرشان یاد می‌گیرند.

گربه‌ها رانیز می‌توان در اثر تعلیم به انجام کارهایی وادار کرد؛ اما برخلاف سگ نمی‌توان در اثر تنبیه و تشویق آنها را کاملاً مطیع خود گرداند، زیرا گربه‌ها تنها کارهایی را انجام می‌دهند که مایل به انجام آن باشند.

حافظه گربه

گربه از قدرت یادگیری و حافظه خود برای انجام کارهایش کمک می‌گیرد. این کارهای عبارتند از:

- باز کردن در به وسیله پریدن روی دستگیره؛
- خبر کردن صاحب خود به وسیله زدن ضربات آهسته به در یا پریدن بر روی زنگ؛
- نوشیدن آب از شیر؛
- استفاده از پنجه اش به عنوان ملاقه برای خوردن شیر از شیشه؛

- پیدا کردن راه خانه؛
- برگشتن، وقتی که او را با نام صدا می‌کنند (حتی اگر پس از مدت‌ها نامش را فراموش کند در زمان غذا دادن اگر او را صدا کنید صدر صد جواب می‌دهد).

گربه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟


گربه خود را برای انجام کارهای اخلاقی متعهد نمی‌کند، آنها این کار را تنها به منظور رسیدن به هدف‌شان به عنوان مثال به دست آوردن غذا انجام می‌دهند. آنها مانند هامستر (موش خرماء) روی کارهای پر زحمت وقت نمی‌گذارند.

آیا گربه‌ها هم حواس شش‌گانه دارند؟

بعضی اوقات چنین تصور می‌شود که به گربه‌ها قدرتی ماوراء الطبیعه اعطا شده است، قدرتی که حتی مانع توائیم آن را تصور کنیم. حواس بینایی، شنوایی و دریافت ارتعاشات آنها بسیار پیشرفته‌تر از انسان است. عکس‌العملهای ماوراء الطبیعی گربه‌ها به وسیله حواس شناخته‌شده آنها قابل توجیه است. وقتی گربه در یک اطاق کاملاً ساکت لاله گوشش را بلند می‌کند، نتیجه عکس‌العمل در برابر صدای ارتعاشاتی است که ما آنها را نمی‌شنویم. حتی گربه‌ها قبل از فوران آتش‌نشان از محل زندگی خود خارج می‌شوند که این نتیجه درک تغییرات در فشار هوای اطراف می‌باشد.

زبردستی گربه

بوسیله مطالعه دقیق رفتار انسان، یک گربه زیرک بازکردن در را یاد می‌گیرد. اگر دستگیره بقدرتی بلند باشد که گربه ناچار است روی دو پایش بایستد، گربه می‌تواند با پرش روی دو پا در را باز کند.



قوه ابتکار گربه

این گربه یاد گرفته که بر روی میز رفته و بوسیله پسجهاش از درون فنجان خامه بخورد.

شکار

مانند گربه‌های وحشی، گربه‌های اهلی طبیعتاً درنده‌خو هستند؛ اما این گفته به این معنی نیست که گربه‌ها با علاقه به شکار می‌پردازند، بلکه انگیزه شکار در گربه‌ها چشم و هم‌چشمی و رقابت با یکدیگر می‌باشد. مهارت شکار به وسیله مشاهده شکار توسط سایر حیوانات و با رنج و زحمت فراوان کسب می‌شود. برای مثال گربه‌ها بطور ذاتی در شکار پرندگان مهارت کافی ندارند، اما به وسیله تمرین در این کار مهارت می‌یابند. بچه گربه‌ایی که از مادران غیرشکارچی متولد می‌شوند نمی‌توانند بخوبی شکار نمایند.

چرا گربه‌های اهلی شکار می‌کنند؟

برخلاف گربه‌های وحشی، گربه‌های اهلی اغلب جهت غلبه بر گرسنگی شکار نمی‌کنند. هرچند که گاهی آنها قطعاتی از شکارشان یا تمام آن را می‌خورند، در حقیقت گربه‌ها جهت تفریح شکار می‌کنند.

گربه‌ها چه چیزهایی را صید می‌کنند؟

گربه‌ها قادرند هر چیز متحرکی را بگیرند، اما بهترین شکار برای گربه‌ها جوندگانی مانند موش و پرندگان کوچک هستند. حیوانات خانگی مثل موش خرما (هامستر) هم در این دسته قرار می‌گیرند که جزو حیوانات دست‌آموز خانگی هستند. بنابراین همیشه مطمئن شوید قفس آنها در جای امن و مطمئنی قرار دارد.

طرز برخورد شما با موجودی که گربه شکار کرده؟

اگر گربه شما در حالیکه موش مرده‌ای در دهانش است به خانه آمد با گشاده رویی آن را بپذیرید ولی سعی کنید هر چه سریعتر حیوان صیدشده را از آن بگیرید، زیرا حیوانات وحشی که توسط گربه صید می‌شوند اکثرًا دارای بیماریها و انگلها می‌باشند.

شکار پرنده‌گان


اکثر صاحبان گربه، گرفتن پرنده‌گان توسط گربه را ناپسند می‌دانند و برای این منظور زنگوله‌ای را در گردن گربه قرار می‌دهند تا هنگام نزدیک شدن آنها به پرنده‌گان، آنها را از خطر مطلع کند. این کار مفید است اما اگر مؤثر واقع نشد نامیدنشوید. اگر شما پرنده اهلی در باعجه دارید مطمئن شوید که پرنده در باعجه آزاد است تا در صورت حمله گربه راه فرار داشته باشد.

صید مگس

اغلب گفته می‌شود که گربه‌ها در اثر گرفتن و خوردن مگسها لاغر و مریض می‌شوند. این مطلب به تأیید رسیده است که خوردن مگس احتمال دارد که گربه را به بیماریهای باکتریایی مبتلا کند. مگسها همچنین ممکن است در انتقال تخم کرمها از یک گربه به گربه دیگر نقش داشته باشند، اما احتمال آن آنقدر ناچیز است که قابل چشم‌پوشی می‌باشد.

رفتارهای اجتماعی گربه

- گربه‌ها به طرق مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می‌سازند:
- صوت: از صدای خرخر گرفته تا جیغهای ناشی از عصبانیت و نالهای شکوه‌آمیز؛
- علایم جسمانی: حالات صورت، حرکات بدن و وضعیت دم که توسط حالات پوشش خارجی تشدید می‌شوند؛
- حس تماسی: گربه‌ها با مالش بینی خود و تماس بدن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌سازند؛
- رایحه: بوی گربه‌ها موجب تعیین دامنه سلطه آنها شده و در تشخیص و تمایز افراد گروه به کار می‌رود.




گربه‌ای با حالت تدافعی:

اولین عکس العمل چنین گربه‌ای هنگام مواجهه شدن با گربه‌ای با رفتار تهاجمی، بلندکردن بدن خود از زمین است.



گربه مهاجم :

گربه غالب از حرکات بدنی خود برای
تشویق گربه مقابله به برگرداندن دم
استفاده می‌کند.



گربه مطیع :

وقتی گربه با حیوانی که از خودش مهاجم‌تر است روبرو شود
حالت اطاعت خود را با حرکات بدن به آن نشان می‌دهد.

رفتارهای ضد اجتماعی گربه

وقتی گربه‌ای در تمام روز در خانه تنها نگهدارشده شود از همنشینی با سایر

گربه‌ها و همچنین انسانها بی‌بهره می‌مانند، چنانی گربه‌ای ممکن است تنها و خسته شده و کارهای رشتی انجام دهد. از جمله این کارها جویدن فرش، ادرار کردن در جاهای متنوعه و گاز گرفتن خودش می‌باشد. در چنانی مواردی با دامپزشک مشورت کنید تا راه چاره را به شناسان دهد.

تشخیص قلمرو فرمانروای گربه

تشخیص قلمرو فرمانروای گربه از دو طریق عمدۀ امکان‌پذیر است: یکی پاشیدن ادرار در اطراف منطقه زیر سلطه و دیگری خراشیدن درختان به وسیله چنگالها.





خراسیدن :

مانند سایر علایم بینایی، خراش‌هایی که گربه با چنگالهایش روی درختان ایجاد می‌کند به همراه بویی که توسط غدد عرق موجود در پنجه گربه ایجاد می‌شود در تعیین قلمرو فرمانروای گربه مؤثر است.

پاشیدن ادرار :

قلمرو فرمانروایی گربه که بوسیله ادرار مشخص شده باشد خیلی جلب توجه می‌کند، مخصوصاً اگر گربه، نر باشد.



مالش :

غدد چربی موجود در ناحیه سر و گردن دارای رایحه‌ای می‌باشند که در اثر تماس با سایر اشیاء بروی آنها می‌ماند و در تعیین قلمرو فرمانروایی گربه مؤثر است.

خواب

گربه‌ها چه وحشی، چه اهلی قسمت زیادی از وقت خود را در خواب

می‌گذرانند. بطور کلی گربه‌ها علاقه خاصی به خواب و استراحت دارند. جای مورد علاقه آنها برای استراحت نقطه‌گرمی روی طاقچه یا تشك است. متوسط خواب گربه‌ها در روز ۱۶ ساعت است، اگرچه هر بار فقط چند دقیقه می‌خوابند. این که چرا گربه‌ها از سایر پستانداران بیشتر می‌خوابند هنوز نامشخص است.

وقتی گربه‌ای می‌خوابد چه اتفاقاتی می‌افتد؟

گربه‌ها چه در خواب و چه در بیداری، بطور مرتب اطلاعاتی را از محركهای محیطی دریافت می‌کنند. در تحقیقات علمی، گربه‌ای را در یک اطاق کامل‌ساخت قرار دادند و الکتروآنسفالوگراف را به مغز آن متصل کردند. در این حالت، دستگاه اطلاعاتی را از فعالیت مغز گربه ثبت می‌کرد. مغز گربه‌های خوابیده را با الکتروآنسفالوگراف مورد مطالعه قرار داده‌اند و مراحل خوابهای عمیق و سطحی مشخص شده‌است. ۳۰٪ خواب گربه، عمقی و ۷۰٪، سطحی می‌باشد. مراحل به صورت متناوب می‌باشند. مدارکی به دست آمده است که نشان می‌دهد گربه‌ها در حال خواب عمیق خواب می‌بینند. شما ممکن است علایم خارجی خواب دیدن را ببینید: حرکت پنجه‌ها و چنگالها، حرکت ناگهانی سبیلهای تکان‌گوشها و در بعضی موارد صدا درآوردن. در حقیقت، در حالت خواب عمیق مغز گربه مانند حالت بیداری فعال می‌باشد و بطور مرتب علایم خطر را از محیط دریافت می‌کند. به همین دلیل هرگز دم گربه‌ای را که در خواب است نکشید.

۲

مراقبت بهداشتی گریه

علایم عمومی بیماری

درصورتیکه گربه افسرده و کسل است، هر چه سریعتر آن را نزد دامپزشک ببرید. اولین نشانه بیماری در کلیه حیوانات، کاهش اشتها است. وقتی گربه از خوردن غذاهای روزانه‌اش امتناع می‌ورزد، هر چه سریعتر آن را به کلینیک دامپزشکی ببرید.

یک بار استفراغ، آن هم در تابستان که گربه علف، ملخ یا پرنده می‌خورد جای نگرانی ندارد، اما اگر استفراغ ادامه پیداکند باید به آن توجه کنید.

اسهال در گربه‌ها مخصوصاً آنهایی که در برابر بیماری ویروسی التهاب روده مایه کوبی نشده‌اند نیاز به مراقبت فوری دامپزشکی دارد.

عطسه یا آبریزش از چشم، نشانه مراحل اولیه بیماری ویروسی آنفولانزا است که باید فوراً مدنظر قرار گیرد. وقتی گربه روی ظرف آب خم می‌شود و با وجود تمایل به نوشیدن آب قادر به خوردن آب نیست، نشانه ویروس دیگری است که به لوزه‌ها و حلق حمله می‌کند. در اینگونه موارد نیز باید حیوان را بسرعت به دکتر دامپزشک ارجاع دهید.

تکان دادن سر، خاراندن گوش و نامتعادل نگه داشتن سر، همگی نشانه بیماری گوش می‌باشند. در این موارد نیز گربه را به دامپزشک ارجاع دهید. تنفس بد یا ریزش آب از دهان نشانه مشکل دندانی در گربه است.

زور زدن مداوم برای دفع ادرار یا مدفعه، نشانه حضور بیماری در مثانه یا روده می‌باشد. هر دوی این بیماریها بسرعت باید معالجه شوند. خارش مداوم پوست یا کچلی می‌تواند به دلیل آلودگی به گک، شپش، جرب یا اگزماهی هورمونی باشد. همه

اینها باید توسط دامپزشک معالجه شوند. بطور خلاصه، اگر گربه شما بیش از ۲۴ ساعت افسرده و رنگ پریده است، آن را فوراً به کلینیک دامپزشکی ببرید.

دستگاه تنفس

طریقه عمل دستگاه تنفس

هوای طریق بینی گربه وارد راههای هوایی شده سپس به ریه‌ها راه می‌یابد. در ریه اکسیژن هوا گرفته شده و دی اکسید کربن به هوای بازدمی منتقل می‌شود. اکسیژن گرفته شده از طریق خون به همه سلولهای بدن حمل و دی اکسید کربن از سلولها دور می‌شود. گربه در حالت استراحت ۲۵-۳۰ بار در دقیقه نفس می‌کشد، در حالیکه ما فقط ۱۰-۱۵ بار در دقیقه نفس می‌کشیم.

اختلالات دستگاه تنفس

● سرفه

سرفه معمولاً با عفونتهای تنفسی همراه است. سرفه عملی غیرارادی است که به دلیل وجود مواد محرک در راههای هوایی ایجاد می‌شود و هدف آن تمیز کردن مجاری از مواد محرک می‌باشد.

نکات زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه چیزی بلعیده که حلقش را مسدود کرده است؟ اگر چنین است، کمکهای اولیه را در مورد آن انجام دهید.
- آیا شواهدی مبنی بر آنفولانزا یا سرماخوردگی مانند تب، مشکلات تنفسی، ترشح مواد از بینی یا چشم یا عطسه وجود دارد؟
- آیا سرفه صدای حباب دار دارد؟ اگر چنین است سینه چرکی شده است.
- آیا سرفه خشک و کوتاه است؟ اگر چنین است گربه دچار آماس نایزه (برونشیت حاد) شده است.
- آیا مواد آلوده کننده مانند دود سیگار یا اجرام معلق در هوا وجود دارد؟

دلایل احتمالی

- انسداد حلق؛
- بیماری ویروسی دستگاه تنفس؛
- برونشیت؛
- آرژی یا حساسیت؛
- حساسیت به مواد آلوده کننده.

درمان

- اگر سرفه ناشی از انسداد است، کمکهای اولیه در این مورد را انجام دهید.
- اگر سرفه ناشی از وجود مواد آلوده کننده در هوا است، پنجره‌ها را باز کنید.

تا هوای اتاق عوض شود.

- اگر گربه حساسیت (آلرژی) دارد، می‌توانید داروی آنتی‌هیستامین که به وسیله دامپزشک تجویز می‌شود به گربه بدهید.
- در سایر موارد کاری از دست شما ساخته نیست، مگر اینکه قبل از معاینه دامپزشک گربه را در خانه نگهدارید. داروی ضدسرفه خاصی را نمی‌توان توصیه کرد.

حالت اورژانس

- اگر سرفه به دلیل مواد آلوده‌کننده مثل دود سیگار به وجود آمده باشد، در خانه قابل درمان می‌باشد.
- اگر سرفه به دلیل حساسیت به وجود آمده باشد، در اسرع وقت با دامپزشک تماس بگیرید.
- در سایر موارد تأخیر جایز نیست، هر چه سریعتر با دامپزشک تماس بگیرید.

نفس نفس زدن

- در حالت استراحت، گربه ۲۵-۳۰ بار در دقیقه نفس می‌کشد. بعد از ورزش این میزان به ۶۰-۹۰ بار در دقیقه می‌رسد. اگر شما تصور می‌کنید گربه شما خیلی سریع نفس می‌کشد تعداد دفعات آن را بشمارید.
- موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:
- آیا هوا خیلی گرم است؟ گربه ممکن است برای خنک کردن خودش سریع نفس بکشد.

- آیا سوراخهای بینی گربه مسدود شده‌اند؟ انسداد بینی مانع از نفس کشیدن طبیعی می‌شود.
- آیا علایمی مبنی بر تصادف می‌بینید؟ ریه یا قفسه سینه گربه ممکن است صدمه دیده باشد.
- آیا گربه با حیوان دیگری جنگ کرده یا روپرو شده‌است؟ گربه ممکن است دچار آسیب ریه یا قفسه سینه شده باشد یا اینکه فقط ترسیده است.
- آیا نشانه‌ای از بیماری دستگاه تنفس مانند تب، سرفه، ترشح مواد از چشم یا بینی یا عطسه وجود دارد؟

دلایل احتمالی

- گرمی هوا؛
- انسداد سوراخهای بینی؛
- صدمه ریه یا قفسه سینه؛
- شوک؛
- درد شدید؛
- ترس یا استرس؛
- بیماری ویروسی دستگاه تنفس.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک، کار خاصی نمی‌توانید انجام دهید. گربه را داخل خانه نگهدارید و تا حد امکان کمتر آن را دستکاری کنید.

حالات اورژانس

- اگر مشخص شد که نفس نفس زدن به دلیل گرمای زیاد هوا است، در خانه قابل درمان می باشد.
- در سایر موارد وقت را تلف نکنید، هر چه سریعتر با دامپزشک تماس بگیرید.

نفس کشیدن سطحی

گریه زمانی بطور سطحی نفس می کشد که نفس کشیدن عمیق یا غیرممکن است یا اینکه در دنک می باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گریه تصادف کرده است؟ نفس کشیدن سطحی دلیلی بر وارد آمدن آسیب به ناحیه سینه می باشد؛
- آیا گریه اشتهاش را از دست داده است؟ ممکن است گریه دچار عفونت ویروسی شدیدی شده باشد؛
- آیا لبها، زبان و لشهای خاکستری یا آبی است؟ این عارضه سیانوز نامیده می شود که ناشی از فقدان اکسیژن کافی در خون می باشد.

دلایل احتمالی

- صدمه به ناحیه سینه (دندنهای، دیافراگم یا دیواره سینه) ناشی از تصادف؛
- عفونت دستگاه تنفس؛
- ذات‌الجنب؛

- وجود هوا یا مایعات در حفره سینه.

درمان

وقتی منتظر دامپزشک هستید، گربه را داخل یک اتاق گرم نگهدارید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید. فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

عطسه

عطسه عموماً همراه عفونتهای دستگاه تنفس می‌باشد. عطسه عکس العمل غیرارادی است که به دلیل وجود مواد محرك در راههای هوایی ایجاد می‌شود.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا از بینی گربه موادی ترشح می‌شود؟ اگر چنین است، احتمالاً گربه دچار عفونت سوراخهای بینی یا سینوس شده است.
- آیا شواهدی مبنی بر سرماخوردگی یا آنفولانزا مانند تب، مشکلات تنفسی، ترشح مواد از چشم یا بینی یا سرفه وجود دارد؟

دلایل احتمالی

- عفونت قارچی یا باکتریایی سوراخهای بینی یا سینوسها؛
- بیماری ویروسی؛
- حساسیت (آلرژی)؛

- تومور بینی.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک، کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید. گربه را در اتاقی گرم با تهویه مناسب نگهدارید. قطره بینی توصیه نمی‌شود.

حالت اورژانس

- اگر عالیم دیگری وجود ندارد، سر فرصت با دامپزشک خود تماس بگیرید.
- اگر با عالیم دیگری همراه است، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

خس خس کردن

در این حالت، صدای سوت‌مانندی در هنگام دم و بازدم تولید می‌شود. خس خس به دلیل انسداد جزئی در بعضی از نقاط بین حنجره و نایزه ایجاد می‌شود و باعث تنگی لوله هوایی شده و تولید صدا می‌نماید.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا رنگ زبان، لبها و لثه گربه خاکستری یا آبی شده است؟ این عوارض در صورت عدم وجود اکسیژن کافی در خون به وجود می‌آید که ممکن است مشخص‌کننده بیماری قلبی باشد.
- سرفه ممکن است نشانه وجود کرم در ریه گربه باشد.

دلایل احتمالی

- تنگی نفس (آسم)؛
- کرم ریه؛
- مشکل قلبی؛
- وجود تومور در راههای هوایی.

درمان

شما قبل از معاینه دامپزشک کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید. گربه را داخل اتاق گرم با تهویه مناسب نگهدارید.

حالت اورژانس

فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

آنفولانزا

پیشگیری از آنفولانزا

بهترین راه پیشگیری از آنفولانزای گربه، واکسیناسیون می‌باشد. این روش خیلی قابل اطمینان است، اما بطور صد درصد مانع از آنفولانزا نمی‌شود. آنفولانزاهای خیلی بدخیم از سد دفاعی می‌گذرند و ایجاد علایم خفیف بیماری را می‌کنند که در این حالت وقتی بطور عادی به گربه واکسن زده می‌شود در برابر آن

عکس العمل نشان نمی‌دهد و اینمن نمی‌شود. وقتی گربه واکسینه شد، باید سعی کنید آن را به جاهایی که خطر آلودگی بالاست نبرید.

واکسیناسیون گربه

از دامپزشک خود در مورد اینکه در چه سنی باید بچه گربه واکسینه شود سؤال کنید. معمولاً بچه گربه تا سن نه هفتگی اولین واکسن آنفولانزا را دریافت می‌کند. بعد از ۳-۴ هفته، باید این عمل تکرار شود. بچه گربه‌های زیر نه هفته، هنوز پادتن مادری ضدآنفولانزا را در خون خود دارند که در اینمنی بچه گربه مؤثر است؛ اما اگر خطر آلودگی بالا باشد، ممکن است دامپزشک توصیه نماید که بچه گربه‌ها هم واکسینه شوند.

برای حفظ سلامت گربه خود نکات زیر را به خاطر بسپارید

- همه گربه‌ها به واکسن یادآور سالانه نیاز دارند؛
- اگر گربه شما آبستن است، باید به آن واکسن کشته یا غیرفعال بزنید؛
- فقط گربه‌های سالم باید واکسینه شوند؛
- هیچ حیوانی تا یک هفته پس از واکسن دوم در مقابل آن بیماری اینمن نمی‌باشد.

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش گربه، شامل لوله‌ای است که از دهان شروع و به مقعد ختم می‌شود. همچنین شامل کبد، لوزالمعده، معده و روده‌ها می‌باشد. مهمترین اختلالاتی که در این سیستم اتفاق می‌افتد شامل استفراغ، اسهال، یبوست، کاهش

اشتها، کاهش وزن و تورم شکم می‌باشد که به دلایل مختلف حادث می‌شوند. بعضی از این عوامل مهم نیستند اما تعدادی از آنها زندگی گربه را به مخاطره می‌اندازند و باید توسط دامپزشک معاینه شوند. مشکلات تغذیه‌ای زیاد معمول نیست و در صورت عکس‌العملهای آلرژی به غذا اتفاق می‌افتد. متداول‌ترین آلرژی در گربه‌ها حساسیت به شیر گاو می‌باشد.

نحوهٔ فعالیت دستگاه گوارش

غذا وقتی وارد دهان شد، توسط دندانها خرد شده و با بزاق مخلوط می‌شود. سپس از طریق مری به معده می‌رود. در معده شیره گوارشی غذا را به حالت خمیری در می‌آورد. سپس غذا از معده به دوازده‌هه که قسمت ابتدایی روده باریک است وارد می‌شود. در اینجا آنزیمهای لوزالمعده و صفراء و روده باریک بر غذا اثر کرده و آن را هضم می‌کنند. اجزای محلول غذا از طریق دیواره روده جذب و وارد جریان خون می‌شوند و سپس برای ذخیره انرژی به کبد می‌روند. مواد غیرقابل جذب وارد روده بزرگ شده و از طریق مخرج دفع می‌گردد.

اختلالات دستگاه گوارش

بوی بد دهان

دهان گربه سالم هرگز بو نمی‌دهد، اما بوی موقتی بعد از خوردن گوشت یا ماهی غیرعادی نیست.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه دچار ریزش بzac است؟ اگر چنین است، ممکن است به عفونت دهان یا بیماری لثه مبتلا باشد.
- آیا دندانها لکه دار (زرد) است؟ ممکن است به دلیل پلاک دندانی باشد.
- آیا دهان گربه زخم است؟ ممکن است زخم عفونی باشد.
- آیا گربه استفراغ می کند؟ ممکن است دچار مشکل گوارشی باشد.
- آیا گربه تشنج دارد؟ ممکن است کمبود ویتامین B داشته باشد.

دلایل احتمالی

- عفونت دهان؛
- پوسیدگی دندان؛
- زخم معده؛
- مشکل گوارشی؛
- کمبود ویتامین B.

درمان

در صورت لزوم دندانهای آن را تمیز کنید.

حالت اورژانس

- در صورت امکان، هر چه سریعتر با دامپزشک تماس بگیرید.

بیوست

گریه سالم روزی یک یا دو بار رودهایش را تخلیه می‌کند. مشکل در دفع مدفع به دو دلیل اتفاق می‌افتد؛ انسداد مجاری یا سختی بیش از حد مدفع.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا مدفع سفت یا تیره است؟ این حالت نشانه عدم وجود آب کافی می‌باشد.
- آیا گریه زور می‌زند ولی مدفع خارج نمی‌شود؟ اگر مدفع عادی است، گریه ممکن است مشکل دستگاه ادراری داشته باشد.
- آیا گریه بیحال است؟ این نشاندهنده فقر مواد غذایی می‌باشد.
- آیا گریه موبلنده است؟ رودهای آن ممکن است به وسیله تودهای از مو مسدود شده باشد.
- آیا گریه استفراغ می‌کند؟ ممکن است گریه دچار انسداد شدید روده شده باشد.

دلایل احتمالی

- مصرف کم آب؛
- جیره غذایی نامتعادل؛
- فقدان ورزش؛
- در مورد گریه‌های مسن، ضعیف شدن ماهیچه‌های شکم؛
- تودهای مو؛

- انسداد روده.

درمان

به جیره گربه سبوس اضافه کنید تا محتوای فیبر غذا افزایش یابد.

حالت اورژانس

- اگر مشکل به دلیل جیره غذایی گربه است، می‌توان گربه را در خانه درمان کرد.
- اگر تغییر جیره غذایی اثر کمی دارد، سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید.
- اگر گربه استفراغ می‌کند، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

تشنجی مفروط

اگر متوجه شدید که گربه شما بیش از حد معمول آب می‌نوشد، احتمالاً دچار مشکلی جدی شده است.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا اشتها گربه افزایش یافته است؟ ممکن است گربه دچار مرض قند (دیابت) شده باشد.
- آیا وزن گربه کم شده است؟ این یک علامت جدی و مهم است.
- آیا گربه تحت درمان با داروهای کورتونی می‌باشد؟

- آیا گربه استفراغ هم می‌کند؟ این هم یک علامت جدی است.
- در گربه ماده، آیا بچه دارد؟ اگر ندارد، ممکن است دچار آبسته رحمی شده باشد.

دلایل احتمالی

- دیابت؛
- درمان با داروهای کورتونی؛
- بیماری کبدی یا کلیوی؛
- بیماری هورمونی؛
- مسمومیت؛
- آبسته رحم.

درمان

مایعات را محدود نکنید.

حالت اورژانس

فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

نفخ شکم

این عارضه به دلیل کربوهیدراتهای هضم نشده‌ای است که در روده بزرگ تحت

اثر باکتریها تخمیر شده و گاز تولید می‌کنند.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا جیره غذایی گربه مملو از غذاهای پروتئینی یا جگر است؟
- آیا مشکل عودکننده است؟ اگر چنین است، احتمالاً به دلیل نوعی رژیم غذایی خاص ایجاد می‌شود.
- آیا بطور دائم وجود دارد؟ اگر چنین است، احتمالاً به دلیل مشکلاتی در جذب می‌باشد.
- آیا مدفع دارای رنگ و قوام طبیعی است؟ در صورت منفی بودن، ممکن است عوارض رودهای وجود داشته باشد.

دلایل احتمالی

- رژیم غذایی؛
- سوء جذب در لوله گوارش؛
- عوارض رودهای.

درمان

- به جیره غذایی گربه، مواد فیبری مثل سبوس بیفزایید. جگر و گوشت خام جیره را قطع کنید، در عوض دو قاشق چایخوری پودر ذغال فعال شده یا دو عدد قرص ذغال فعال شده با غذای گربه مخلوط کنید.

حالت اورژانس

- اگر مدفوع حالت عادی دارد، می‌توانید مشکل را در خانه حل کنید.
- اگر مدفوع غیرعادی است، با دامپزشک تماس بگیرید.

کاهش اشتها

دلایل چندی برای امتناع گربه از غذا وجود دارد: بیماری، گرمی هوا و متداولترین آن بی‌علاقگی به نوع غذاست.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا علایم دیگری مانند استفراغ، اسهال یا یبوست وجود دارد؟ اگر چنین است آنها را بطور کامل بررسی کنید.

دلایل احتمالی

کاهش اشتها می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات مختلف باشد.

درمان

به جای اینکه با جبار به حیوان غذا بدھید، سعی کنید انواع مختلفی از غذا در اختیار آن قرار دهید. در صورت امکان مقداری آب قند درست کنید.

حالت اورژانس

اگر اشتهاهای گربه به مدت ۳-۴ روز به مقدار زیاد کاهش یافته، یا اگر برای مدتی بیش از یک روز اصلاً غذا نخورد یا سایر علائم هم وجود داشت، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

پرخوری

اگر میزان غذای گربه شما بطور ناگهانی افزایش یافته، مهمترین دلیل آن آلودگی انگلی می‌باشد، اما ممکن است دچار بیماری متابولیک نیز شده باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه شما مریض یا آبستن است؟ در این موارد، به غذای بیشتری جهت ترمیم نیاز دارد.
- آیا گربه انگل دارد؟
- آیا عطش گربه افزایش یافته است؟ اگر چنین است، به مطلب مورد بحث در مورد تشنجی مفرط رجوع کنید.
- آیا وزن گربه کاهش یافته است؟ اگر چنین است، گربه ممکن است دچار آلودگی انگلی، لوسی یا دیابت باشد.
- آیا وزن گربه افزایش یافته است؟ اگر چنین است، احتمالاً دچار مشکل متابولیک شده است؟

دلایل احتمالی

- بهبود از بیماری؛
- بهبود از زایمان؛
- انگلهای داخلی؛
- دیابت؛
- بیماری لوزالمعده؛
- بیماری غدد.

درمان

غذای گربه را محدود نکنید.

حالت اورژانس


- اگر گربه بیش از دو هفته پرخوری می‌کند یا سایر علایم ظاهر شد، سر فرست با دامپزشک تماس بگیرید.
- اگر علایم دیگری که مشخصه دیابت است ظاهر شد، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

دندانها

پیشگیری از پوسیدگی دندان

برای جلوگیری از تشکیل پلاک دندانی، باید دندانهای گربه خود را تمیز نگه دارید. بسیاری از گربه‌ها نسبت به اینکه هفت‌های یک بار با مسواک نرم و آب‌نمک دندانهای آنها را تمیز کنید ابراز رضایت می‌کنند. اگر گربه مانع از مسواک زدن می‌شود، سالی یک بار آن را نزد دامپزشک ببرید تا تحت شرایط بیهوشی دندانهای گربه را تمیز نماید.

تمیز کردن دندان



- شخصی را به عنوان کمک بگیرید و از او بخواهید به وسیله انگشتان دستش فک بالای گربه را به سمت هم فشار دهد.
- به وسیله انگشت اشاره خود فک تحتانی را پایین نگه دارید و به وسیله یک مسواک بچه که در آب‌نمک رقیق خیس خورده است دندانها را مسواک بزنید.

تورم روده گربه

پیشگیری از تورم روده گربه

از این بیماری کشنده می‌توان به وسیله واکسنی که همراه واکسن آنفولانزا در سن ۸-۹ هفتگی به بچه‌گربه داده می‌شود پیشگیری کرد. تزریق ثانویه واکسن، ۴-۳ هفته بعد از تزریق اولیه انجام می‌گیرد و هر ۱۲ ماه یک بار واکسن یادآور تزریق می‌شود. واکسن‌های کشته نیز موجودند و در مورد گربه‌های آبستن می‌توان از آنها استفاده کرد تا مطمئن شد که پادتن کافی در آغوز مادر وجود دارد و بنابراین بچه گربه‌های تازه متولدشده را مصون می‌دارد.

راههای پیشگیری از بیماریهای روده

- هرگز به گربه استخوان مرغ ندهید؛
- به گربه اجازه شکار کردن ندهید تا هر نوع غذایی نخورد؛
- گربه را بطور منظم شانه کنید تا ریزش مویش کاهش یابد؛
- ماده ضدیبوست بطور مستقیم به غذای گربه اضافه کنید.

انگل‌های داخلی

انگل‌ها در تمام بافت‌های بدن گربه مانند چشم، ریه و قلب یافت می‌شوند.

متداولترین انگل گربه، کرمها هستند و مهمترین گروه این انگلهای آنها یعنی هستند که دستگاه گوارش را آلوده می‌کنند. آنها شامل کرم‌های گرد، کرم نواری و کرم‌های برگی شکل می‌باشند.

کرم گرد

دو نوع کرم گرد از خانواده آسکاریس عوموماً در گربه‌ها یافت می‌شوند که عبارتند از توکسوآسکاریس و توکسوآسکاریس. این کرم‌ها خون نمی‌خورند، بلکه از غذای هضم شده موجود در روده استفاده می‌کنند. تخم کرم از طریق مدفع گربه دفع شده و بطور مستقیم یا پس از عبور از طریق موش، موش صحرایی و سوسک به همان گربه یا به گربه دیگر منتقل می‌شود. لارو کرم می‌تواند در جفت نفوذ کرده و جنین را در داخل رحم آلوده نماید. همچنین گاهی در شیر مادر نیز یافت می‌شوند. در بدن بچه گربه کرم‌ها از طریق کبد، قلب و ریه به روده مهاجرت می‌کنند. بچه گربه‌ها نسبت به گربه‌های بالغ حساسترند و انگلهای ممکن است در آنها موجب اسهال، یبوست، کمخونی، تورم شکم، ضعف و کاهش رشد شوند.

کرم شلاقی و کرم رشته‌ای

این کرم‌ها کوچکتر از آسکاریس بوده و بندرت در گربه‌ها یافت می‌شوند. اینها نیز مثل کرم گرد دارای چرخه زندگی مستقیم بوده و احتیاج به میزبان واسط ندارند. لارو کرم رشته‌ای در روده کوچک ساکن شده و دیواره روده را سوراخ می‌کند و ممکن است موجب خونریزی شود؛ در حالیکه کرم شلاقی روده بزرگ را ترجیح می‌دهد. هر دو نوع انگل باعث اسهال، کاهش وزن و کمخونی می‌شوند.

کرم قلابدار

این کرمها شدیداً خونخوار بوده و از راه دهان یا سوراخ کردن پوست به داخل بدن میزبان راه می‌یابند. سپس مهاجرت کرده و به روده کوچک می‌روند. همچنین می‌توانند از طریق جفت به جنین منتقل شوند. علاوه بر این کرم شامل اسهال (همراه رگه‌های خون)، ضعف و کمخونی می‌باشد.

کرم نواری

خطر این کرم از کرم‌های گرد و کرم‌های برگی‌شکل کمتر است. کرم نواری در روده کوچک و بزرگ زندگی کرده و بدون مکیدن خون، خود را در غذای هضم شده میزبان سهیم می‌کند. وجود این کرمها ممکن است سبب تخریش و نفخ شکم در گربه شود، ولی عوارض دیگر آن کمتر است. وقتی قطعات کرم از مقعد دفع می‌شوند، موجب تحریک می‌گردند. تخم‌های گرد و کوچک کرم که از مقعد گربه دفع می‌شوند، به صورت دانه‌های برنج به ناحیه اطراف مقعد می‌چسبند و اغلب تنها نشانه آلودگی گربه به کرم نواری می‌باشند. وقتی تخم کرم از بدن گربه دفع شد باید توسط میزبان واسطه که موش یا گاک است خورده شود. در بدن میزبان واسطه، تخمها به لارو تبدیل می‌شوند. تنها در صورتیکه میزبان واسط توسط گربه خورده شود لارو قادر است به کرم بالغ تبدیل شود.

کرم‌های برگی‌شکل

در روده کوچک، لوزالمعده و مجرای صفراءوی یافت می‌شوند. این انگل در

آسیا، اروپا و کانادا نسبتاً شیوع دارد. میزبان واسط آن حلزون و یک نوع ماهی آب سرد می‌باشد. علایم بالینی آن عبارت از مشکلات گوارشی، یرقان (زردی)، اسهال و کمخونی می‌باشد.

سایر انگلهای

گربه‌ها ممکن است به وسیله انگلهای تک‌یاخته‌ای میکروسکوپی مانند آمیب، تریکوموناس، کوکسیدیا و ژیارديا آلوده شوند. این انگلهای ممکن است موجب اسهال یا سایر عوارض گوارشی شوند اما به عنوان عامل بیماری چندان متداول نیستند. مهمترین آنها توکسیپلاسم است که به بافت‌های مختلف بدن گربه از قبیل روده حمله کرده و اصولاً از طریق خوردن گوشت خام ایجاد می‌شود. آلودگی شدید به انگل همراه علایمی است که باسانی با سایر بیماریها اشتباه می‌شود. در چنین حالتی احتمال مرگ گربه هم وجود دارد. حالت مزمن بیماری هم وجود دارد. نشانه معمولی که در هر دو شکل بیماری مشاهده می‌شود، اسهال است. گربه، انگل را از طریق مدفوعش دفع می‌کند که ممکن است به انسان منتقل شود. اگرچه این بیماری بندرت اتفاق می‌افتد، اما خطری است که خانمهای باردار را تهدید می‌کند، چراکه ممکن است به جنین آنها منتقل شود.

راه درمان انگلهای

از دامپزشک بخواهید تا بهترین و مؤثرترین داروی ضدکرم را به شما معرفی کند. در اکثر موارد، دامپزشک داروی ضدکرم را برای گربه‌های سالم تجویز می‌کند. معمولاً توصیه می‌شود داروهای ضدکرم را قبل از آبستن شدن گربه به آنها بدهند اما در حین آبستنی هم آنها بطور مطمئن درمان می‌شوند. داروهای ضدانگل معمولاً دو بار داده می‌شوند؛ هدف از بار دوم از بین بردن انگلهای نبالغ است.

راههای پیشگیری از آلودگی انگلی

- به گربه اجازه خوردن حیوانات وحشی را ندهید؛
- گربه را بطور منظم شانه کنید و از پودر ضدانگل استفاده نمایید تا مانع از انتقال لاروهایی شوید که به وسیله ککه‌امنتقل می‌شوند؛
- بستر گربه را بسوزانید یا اینکه در عمق خاک دفن کنید یا اینکه آن را در زباله‌دانی بیندازید؛
- داروهای ضدکرم نواری را هر چهار ماه یک بار و داروهای ضدکرم گرد را هر شش ماه یک بار به گربه بدهید.

چشم و گوش

مراقبت از چشم

بآسانی می‌توان کثافتات اطراف چشم گربه را پاک کرد. چشم گربه باید براق و تمیز باشد. اگر چشم گربه متورم است یا ترشح دارد، ممکن است دچار بیماری شده باشد. برای پاک کردن چشم گربه، یک تکه پنبه را در آب گرم خیس کنید و روی چشم گربه بکشید تا چرکها خارج شوند.

عارض چشم و گوش

تعدادی بیماری چشم و گوش گربه‌ها را مبتلا می‌سازند که متداولترین آنها

کوری و کری است، اما احتمال اینکه گربه‌ای کور یا کر شود اندک می‌باشد، اما مشکلی که شما معمولاً با آن روبرو هستید وجود اجسام خارجی در چشم یا انسداد مجرای گوش به وسیله چرک است. هنگام معاينه از یک ذره‌بین شیشه‌ای و یک چراغ قوه استفاده کنید.

بیرون زدگی چشم

عارضه‌ای است که در آن بافت پشت چشم متورم شده و کره چشم را به بیرون حدقه هل می‌دهد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- بیرون زدگی کره چشم؛
- خیره شدن به یک نقطه؛
- عدم بسته شدن پلکها؛
- اتساع مردمک به دلیل کشیده شدن اعصاب چشم.

دلایل احتمالی

- عوارض ناشی از ضربه؛
- انتشار عفونت از سینوس به چشم؛
- تومور پشت کره چشم؛
- آب سیاه (گلوکوم).

درمان

قبل از رسیدن دامپزشک، کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید. فقط گریه را در خانه نگهدارید.

موارد اورژانس

فوراً با دامپزشک تماس پگیرید. برای کاهش تورم ممکن است دارو یا جراحی لازم شود.

ترشح مواد از چشم

ترشحات شفاف، در گریه‌های موبلنده نسبتاً متداول بوده و اغلب به دلیل انسداد کانالهای اشک حاصل می‌شود. ترشحات کدر کمتر متداول‌تر و لی از حدت زیادتری برخوردارند، چراکه می‌تواند به علت عفونت باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا ترشحات به رنگ روشن هستند؟ اگر چنین است، احتمالاً مجرای اشک گریه مسدود شده است.
- آیا ترشحات کدر هستند؟ اگر چنین است، گریه ممکن است دچار عفونت ویروسی یا باکتریایی شده باشد.
- آیا چشم گریه درد می‌کند؟ در این صورت به قسمت چشم درد مراجعه کنید.

دلایل احتمالی

- انسداد مجرای اشک؛
- ورم ملتجمه؛
- بیماری ویروسی دستگاه تنفسی؛
- بیماری چشم مثل آبسیاه (گلوکوم).

درمان

اجازه ندهید که ترشحات چشم گربه موی آن را آلوده کند. اطراف چشم گربه را به وسیله پارچه کتانی که در آب گرم خیس خورده است، تمیز نمایید.

حالت اورژانس

- اگر ترشحات به رنگ روشن است، سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید؛
- اگر ترشحات کدر است، هر چه سریعتر با دامپزشک تماس بگیرید.

اختلال بینایی

این حالت را با نگاه کردن به چشم گربه نمی‌توان تشخیص داد، بلکه شما با مشاهده رفتار گربه به آن پی می‌برید.
اگر فکر می‌کنید که گربه شما ممکن است به مشکلات بینایی دچار شده باشد، هر بار یک چشم گربه را مورد آزمایش قرار دهید.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا تعادل گریه از بین رفته است؟
- آیا با اسباب و اثاثیه خانه برخورد می کند؟
- آیا چشمها گریه کدر به نظر می رسد؟
- اگر چنین است، ممکن است حیوان مبتلا به عفونت شدید چشم باشد.
- آیا در برابر اشیای متحرک واکنش نشان می دهد؟

دلایل احتمالی

- بیماریهایی مانند بیماری شبکیه، آب مروارید، کدورت قرنیه یا گلوكوم؛
- عواملی که روی مغز تأثیر می گذارند مانند ورم مغز که در اثر عفونت، ضربه، تومور یا بیماری عصبی ارثی ایجاد می شود.



آزمایش بینایی:

برای این کار یک چشم گریه را ببندید، سپس انگشتستان را به طرف چشم دیگر گریه حرکت دهید. اگر گریه چشمش را بست، چشم گریه دارای قدرت بینایی می باشد.

درمان

مراقبت فوری دامپزشکی لازم است. ضمناً، گربه را در خانه در محلی که برایش آشناست نگهداری کنید. همچنین در جلوی شومینه حفاظتی برای جلوگیری از نزدیک شدن گربه قرار دهید.

حالت اورژانس

تأخیر نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید. از دست دادن کامل یا جزئی بینایی، به وسیله درمان سریع قابل بازگشت می باشد.

چشم درد

وجود اجسام خارجی در چشم، جراحت ناشی از ضربه یا بیماری ممکن است چشمهای گربه را متأثر کنند. نشانه معمول این عارضه درد یا ناراحتی می باشد.


موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه پلکهایش را می بندد؟ گربه ممکن است به عفونتی آزاردهنده یا خراش قرنیه دچار شده باشد.
- آیا گربه به چشمش چنگ می زند؟ گربه ممکن است به عفونت تحریش کننده یا وجود جسم خارجی در چشم دچار شده باشد.
- آیا داخل یا روی کره چشم گربه کدورتی به رنگ سفید یا آبی می بینید؟ این علائم ممکن است نشاندهنده آب مروارید باشد.

- آیا از چشم گربه موادی ترشح می‌شود؟ اگر چنین است به مطلب مربوط به ترشحات چشم رجوع کنید.

دلایل احتمالی

- وجود جسم خارجی در چشم؛
- ورم ملتجمه؛
- عفونت شدید مانند گلوکوم (آب سیاه)؛
- آب مروارید؛
- جراحات ناشی از ضربه؛
- تومور؛
- بیماری مادرزادی.



شستن چشم گربه :
از یک تکه کتان برای چکاندن
مایع آرامبخش در چشم گربه
استفاده کنید.

درمان

در همه موارد می‌توانید به وسیله شستن چشم گربه با محلول مسکن به آن کمک کنید. بهترین روش انجام کار اینست که تکه‌ای کتان را در چای سرد یا

محلول حاصل از یک قاشق چایخوری اسید بوراسیک در یک فنجان آب گرم خیس دهید و مایع را در چشم گربه بچکانید.
اگر چشم گربه خونریزی می‌کند، تکه‌ای کتان پشمی را که در آب سرد خیسانده‌اید روی چشم گربه نگهدارید تا دامپزشک برسد.

حالت اورژانس

فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

کری

گربه‌ای که از حس شنوازی برخوردار است، سرش را به طرف جهت صدا چرخانده و گوشش رانیز به اطراف حرکت می‌دهد تا به طرف محل دقیق صدا قرار گیرد. اگر گربه شما این کار را انجام نمی‌دهد، ممکن است کر شده باشد. این حالت بسته به عامل مسبب آن ممکن است موقتی یا دائمی باشد. عوامل ارضی یا بیماریهای گوش داخلی معمولاً باعث کری دائمی می‌گردند، در حالیکه عفونت گوش خارجی و میانی یا وجود موم یا انگلها موجب کری وقت خواهند شد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا علایمی مبنی بر تشکیل موم در گوش وجود دارد؟ در این صورت ممکن است کanal گوش مسدود شده باشد.
- آیا دلایلی مبنی بر تخریش، درد (زخم) یا ترشح مواد از گوش وجود دارد؟ آینه‌ها نشاندهنده عفونت گوش میانی یا خارجی می‌باشند.

- آیا گربه سرش را به یک سمت نگه می‌دارد؟ این علامت نشاندهنده عفونت گوش داخلی یا میانی می‌باشد.
- آیا گربه شما سفیدرنگ است؟ ممکن است حیوان به کری ارثی مبتلا باشد.
- آیا گربه مسن است؟ در این صورت مسایل ناشی از افزایش سن ممکن است موجب بروز این عارضه شده باشند.

دلایل احتمالی

- انسداد گوش به وسیله مو؛
- عفونت گوش خارجی؛
- عفونت گوش میانی؛
- عفونت گوش داخلی؛
- عامل ارثی؛
- بالا رفتن سن.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک، کار چندانی نمی‌توانید انجام دهید.

حالات اورژانس

- سر فرصت گربه را به کلینیک دامپزشکی ببرید. دامپزشک، گوش گربه را از لحاظ موم، عفونت، تومور یا انگلها مورد معاینه قرار می‌دهد.

ترشح مواد از گوش

این مشکل در گریه‌ها متداول است و معمولاً نشانه‌ای از آلودگی باکتریایی یا انگلی گوش می‌باشد. اغلب می‌توان از چنین مشکلاتی به وسیله معاينة منظمه گوش و تمیز کردن نواحی اطراف گوش خارجی پیشگیری کرد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا ترشحات تیره و مومی است؟ در این صورت ممکن است گریه دچار جرب یا آلودگی قارچی گوش باشد.
- آیا ترشحات چرکی است؟ اگر چنین است، گریه ممکن است دچار عفونت باکتریایی باشد.
- آیا گریه سرشن را تکان می‌دهد؟ این نشانه آلودگی گوش به جرب می‌باشد.

دلایل احتمالی

- جرب گوش؛
- عفونت باکتریایی؛
- عفونت قارچی.

درمان

با آرمی نواحی اطراف گوش را تمیز کنید. برای این منظور، از تکه‌ای کتان که

در روغن زیتون گرم خیس خورده استفاده کنید. نگذارید که ترشحات، موی گربه را آلوه کند. نواحی اطراف گوش را با آب گرم بشویید و سپس آن را بدقت خشک کنید. نگذارید گربه گوشش را بخاراند، زیرا این کار ممکن است باعث تجمع خون در زیر پوست شود که تحت عنوان هماتوم نامیده می‌شود. هیچ شیئی حتی انگشت خود را وارد کanal گوش گربه نکنید. ناحیه خارجی گوش را با حرکت دوار تکه‌ای پارچه تمیز کنید.

موارد اورژانس

- سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید.

پیشگیری از بیماریهای گوش

معاینه منظم گوش گربه ضروری است، اما هرگز موچین، انگشت یا تکه‌ای کتان را وارد گوش گربه نکنید. کanal خارجی گوش باید تمیز باشد. اگر در گوش گربه موم یا چرک به رنگ قرمز قهوه‌ای وجود دارد، قبل از آنکه منجر به عفونت گردد آن را تمیز کنید.



۱ - تکه کوچکی کتان پشمی را با روغن زیتون گرم مرطوب کنید. سپس آن را به آرامی با حرکت پیچشی وارد گوش گربه کنید.



۲ - از قطره گوش که مخصوص گربه است و به وسیله دامپزشک تجویز می‌شود، استفاده کنید. سپس گوش گربه را ماساژ دهید تا دارو حل شود.

استعمال پماد در چشم گربه

سر گربه را با یک دست نگه دارید و از دست دیگر خود برای استعمال پماد استفاده کنید. فقط از پمادی که مخصوص گربه است و به وسیله دامپزشک تجویز می‌شود استفاده کنید و از سایر پمادها قبل از معاینه دامپزشک استفاده نکنید.



۱ - لوله پماد را به موازات چشم گربه نگهدارید. مراقب باشید باکره چشم گربه بروخورد نکند، سپس پماد را به داخل چشم گربه فشار دهید.



۲ - پلکهای چشم گربه را به آرامی برای چند لحظه بیندید تا پماد روی کره چشم حل شود.

مجرای ادراری

اختلالات مجرای ادراری

دفع غیرعادی ادرار

جای طبیعی ادرار کردن گربه محلی است که از قبل آنجا را علامت‌گذاری کرده باشد. با ترتیب مناسب گربه، می‌توان بستر را به عنوان یکی از این محلها تعیین کرد. اگر گربه در جای دیگری ادرار کرد، آن محل را بدقت با مواد ضدغونی‌کننده قوی بشویید تا از تکرار این عمل جلوگیری شود.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه تازهوارد است؟ زیرا در این حالت گربه عصبی است یا اینکه هنوز با ستر آشنایی ندارد.
- آیا گربه نر اخته نشده است؟ زیرا در این حالت گربه برای تعیین قلمروی خودش این کار را انجام می‌دهد.
- آیا عطش گربه افزایش یافته است؟ زیرا چنین حالتی دلیل بر بیماری دیابت می‌باشد.
- آیا عالیم دیگری مانند زور زدن، استفراغ یا اسهال وجود دارد؟ چنین حالتی دلیل بر عفونت می‌باشد.

دلایل احتمالی

- نشانه‌گذاری در مناطق تحت قلمرو؛
- دیابت؛
- التهاب مثانه؛
- التهاب میزراه؛
- آسیب مثانه.

درمان

اگر گربه شما نر است و مرتب ادرار می‌کند، ابتدا ترتیب اخته شدن آن را بدھید یا اینکه آن را در محوطه بسته‌ای در خارج خانه نگهداری‌د. اگر گربه شما نر

نیست و سایر عالیم مانند زور زدن، افزایش عطش، استفراغ یا اسهال وجود ندارد، روزی ۲-۳ بار قرص هگزامین (Hexamine) ۲۵۰ میلی‌گرمی به آن بدهید. آب فراوان در اختیار گربه قرار دهید، زیرا کم کردن مایعات نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه ممکن است به کلیه آسیب برساند. در اینگونه موارد اجازه ندهید گربه ادرار خود را استشمام کند زیرا این عمل آن را تحریک می‌کند تا بار دیگر از همان محل برای ادرار کردن استفاده کند.

حالت اورژانس

- اگر سایر عالیم وجود ندارد، سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید.
- اگر سایر عالیم مانند زور زدن، افزایش عطش، استفراغ یا اسهال وجود دارد، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

زور زدن

اگر گربه زور می‌زند و یبوست هم ندارد، احتمالاً دچار انسداد مجاری ادراری می‌باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه در خلال ۲۴ ساعت هیچ مدفوع نکرده است؟ در چنین مواردی، ممکن است یبوست داشته باشد یا اینکه دچار انسداد روده باشد.
- آیا گربه بطور طبیعی ادرار می‌کند؟ در غیر این صورت، احتمال انسداد وجود دارد.

- آیا به نظر می‌رسد که گربه درد دارد؟ در این صورت ممکن است حیوان به عفونت دستگاه ادراری مبتلا باشد.
- آیا حیوان شما آبستن است؟ اگر چنین است ممکن است درد زایمان آن شروع شده باشد.

دلایل احتمالی

- یبوست؛
- انسداد روده؛
- تورم مثانه؛
- سنگ ادراری؛
- درد زایمانی.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک، کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید؛ هر چه سریعتر با دامپزشک تماس بگیرید.

پیشگیری از انسداد ادراری

- گربه‌های نر را قبل از نه ماهگی اخته نکنید؛

- مقدار زیادی آب آشامیدنی در اختیار گربه قرار دهید؛
- از دادن مقدار زیادی غذاهای خشک خودداری کنید؛
- مقدار کمی نمک به غذای گربه بیفزایید تا آن را تغییب به نوشیدن کند.

دستگاه تناسلی

اختلالات تناسلی

سقوط جنین

شروع زودرس درد زایمان در گربه غیرمعمول است، اما اگر گربه آبستن شروع به زور زدن کند ولی زایمانی انجام ندهد، به سقط جنین قریب الوقوع مظنون شوید.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا خون یا ترشحات دیگری در فرج وجود دارد؟
- آیا علایم دیگری از بیماری مانند استفراغ یا اسهال وجود دارد؟ گربه ممکن است دچار عفونتی باشد که موجب زایمان زودرس گردد.
- آیا مطمئن هستید که درد زایمان آن زودتر از موقع شروع نشده است (زودتر از نه هفته بعد از جفتگیری)

دلایل احتمالی

- تصادف؛
- عفونت؛
- وضع غیرعادی جنین.

درمان

گربه را تا رسیدن دامپزشک در جای آرامی نگهدارید.

حالت اورژانس

اگر مطمئن هستید که درد زایمان زودتر از موعد شروع شده است، وقت را تلف نکنید؛ فوراً با دامپزشک تماس بگیرید. اگر شک دارید سه ساعت منتظر بمانید. اگر بچه گربه‌ای متولد نشد با دامپزشک تماس بگیرید.

ناباروری

ناتوانی گربه ماده در بچه‌دار شدن ممکن است نتیجه جفتگیری ناموفق یا نقص فیزیکی - جسمانی در گربه نر یا ماده باشد.
اگر جفتگیری به صورت طبیعی انجام شده باشد، دلیل اصلی می‌تواند عفونت دستگاه تناسلی گربه ماده باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا به گربه شما ضربه‌ای وارد شده است؟ اگر چنین باشد، ممکن است سقط جنین زودرس داشته باشد.
آیا گربه ماده شما علایمی از بیماری رانشان می‌دهد.
- آیا دوره‌های فحلی آن منظم می‌باشد؟ فحلی مداوم و دائمی نشانه‌ای از کیست تخمدان است.
- آیا گربه ماده علایم معمول آبستنی را بعد از جفتگیری نشان می‌دهد؟ در غیر این صورت ممکن است حیوان به آبستنی کاذب مبتلا باشد.

دلایل احتمالی

- سقط جنین نامشخص (غیر واضح)؛
- عفونت رحم یا مهبل؛
- وجود چرک در داخل رحم؛
- کیستهای تخمدانی؛
- فقدان مادرزادی یا غیرطبیعی بودن اعضای تناسلی؛
- آبستنی کاذب؛
- انسداد مجراری فالوپ؛
- فقدان تخمک‌گذاری.

درمان

قبل از معاینه توسط دامپزشک کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

درمان ورم پستان

این عارضه در اثر مکیدن پستان توسط بچه گربه‌ها ایجاد می‌شود؛ در اثر آن جراحات سطحی در پستان حاصل شده و راه را برای نفوذ باکتریها فراهم می‌کند. شما می‌توانید چندین بار در روز با استعمال محلول اشباع سولفات منیزیم و آب گرم تورم را تخفیف دهید.



۲ - ناحیه مربوطه را به ملایمت و بطور کامل خشک کنید، سپس پودر ضد عفونی کننده‌ای روی آن بپاشید.

۱ - غدد متورم را به وسیله تکه‌ای کتان که در محلول سولفات منیزیم خیس خورده تمیز کنید.

دستگاه عصبی

اختلالات عصبی

تلوتلو خوردن

اگر گربه تلوتلو می‌خورد، می‌افتد یا معمولاً در ایستادن مشکل دارد، ممکن است اختلالی در سیستم عصبی آن وجود داشته باشد. تعادل همچنین ممکن است در اثر عارضهٔ گوش نیز مختل شود.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه سم خورده است؟
- آیا گربه تصادف کرده است؟ در این صورت، ممکن است به آن شوک وارد شده باشد یا به صورت خیلی جدی به مغز یا نخاع آسیب رسیده باشد.
- آیا عالیم دیگری مانند استفراغ یا گشاد شدن مردمگ چشم وجود دارد؟ در این صورت ممکن است بیماری شدیدی داشته باشد.

دلایل احتمالی

- مسمومیت؛

- شوک؛
- ضایعه یا بیماری مغزی؛
- مشکلات نخاعی؛
- بیماری گوش میانی؛
- ضعف شدید به دلیل یک بیماری خاص؛
- بیماری عضلانی.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

لرزه

لرزش عمومی معمولاً در گربه‌ها نادر است. آنها وقتی هوا سرد است مانند ما نمی‌لرزند و بروز چنین حالتی، اختلالی در سلامتی گربه را نشان می‌دهد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه تصادف کرده است؟ ممکن است گربه دچار شوک باشد.
- آیا گربه سم خورده است؟

- آیا علایمی از بیماری مانند استفراغ، اسهال یا گشاد شدن مردمک چشم دارد؟
- آیا فضولات ناشی از انگلهای خارجی در لابلای موهای گریه وجود دارد؟

دلایل احتمالی

- شوک؛
- سمومیت؛
- بیماری یا ضایعه سیستم عصبی؛
- انگلهایا.

درمان

اگر شواهدی مبنی بر وجود انگل خارجی وجود دارد، از پودر یا اسپری ضدانگل استفاده کنید. اگر دلیل آن انگل نیست، قبل از معاینه دامپزشک کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید.

حالت اورژانس

- انگلهای را می‌توان در خانه درمان کرد.
- در سایر موارد وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

فلجی

اگر گریه شما قادر به حرکت دادن کل یا قسمتی از بدنش نیست، دلیل آن

می‌تواند ضایعه بیماری عصبی باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا شواهدی مبنی بر تصادف کردن گربه وجود دارد؟ ممکن است حیوان به آسیبهای نخاعی یا شکستگی مهره‌ها مبتلا شده باشد.
- آیا مردمک چشم گربه گشاد شده است؟ ممکن است حیوان به تورم مغز دچار شده باشد.
- آیا فالجی فقط در اندامهای عقبی گربه است؟ اگر چنین است نشاندهنده ضایعه یا بیماری نخاع می‌باشد.
- آیا احتمال دارد که گربه سم خورده باشد؟

دلایل احتمالی

- بیماری یا ضایعه نخاعی؛
- شکستگی لگن یا پا؛
- بیماری مغز؛
- بیماری استخوانی؛
- مسمومیت؛
- کزان.

درمان

قبل از معاینه دامپزشک، کار زیادی نمی‌توانید انجام دهید. اگر گربه در محل

نالمنی قرار دارد، آن را از محل دور کنید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

سیستم اسکلتی و عضلانی

اختلالات سیستم اسکلتی و عضلانی

لنگش

دلایل زیادی مبنی بر اینکه چرا گربه‌ای پای خود را روی زمین می‌کشد یا چرا وزنش را روی یک عضو تحمیل نمی‌کند وجود دارد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا وقتی عضو آسیب دیده را المنس می‌کنید، گربه احساس درد دارد؟ این عمل نشاندهنده عفونت یا ضایعه آن عضو می‌باشد.
- آیا فقط یک عضو آسیب دیده است؟ اگر چنین است، آیا عضو آسیب دیده ضخیمتر از سایر اعضاست؟ عضو مربوطه ممکن است شکسته یا پیچ خورده باشد.

- آیا روی عضو مربوطه خونی هم وجود دارد؟ گربه ممکن است تصادف کرده باشد.
- آیا عضو مربوطه متورم است؟ تومور ممکن است دلیل تورم باشد.

دلایل احتمالی

- عفونت استخوان؛
- صدمه ناشی از تصادف؛
- شکستگی؛
- پیچ خورده‌گی؛
- زخم؛
- تومور.

درمان

اگر لازم است کمکهای اولیه را انجام دهید. هرگز از داروهای تخفیف‌دهنده درد که مخصوص انسان یا سگ می‌باشد استفاده نکنید. گربه را قبل از معاینه دامپزشک در خانه نگهدارید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

تورم اندامهای حرکتی

تورم ناگهانی اندامهای حرکتی گربه به احتمال زیاد ناشی از عفونت می‌باشد.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا گربه با حیوانات دیگر جنگ کرده است؟ گازگرفتگی ممکن است باعث عفونت گردد.
- آیا فقط یک عضو آسیب دیده است؟ عضو مربوطه ممکن است شکسته یا تومور داشته باشد.
- آیا شکم گربه بزرگ شده است؟ اختلالات کلیوی یا اگردش خون ممکن است باعث خیز یا ورم گردد.
- آیا گربه شما بعد از یک دوره استراحت، شق یا سفت به نظر می‌رسد یا در حرکت کردن مشکل دارد؟ ممکن است حیوان دچار تورم مفصل باشد یا اینکه به سایر بیماریهای استخوانی مبتلا شده باشد.

دلایل احتمالی

- عفونت استخوان؛
- شکستگی؛
- تومور؛
- ورم؛
- ورم مفصل.

درمان

اگر لازم است کمکهای اولیه را انجام دهید. گربه را قبل از معاینه دامپزشک در خانه نگهدارید.

حالت اورژانس

وقت را تلف نکنید، فوراً با دامپزشک تماس بگیرید.

درمان پیچ خوردگی

پیچ خوردگی بندرت در گربه‌های لاغراندام و سبک اتفاق می‌افتد. در صورت بروز، علایم آن شامل درد و کاهش کارآیی قسمت آسیب‌دیده می‌باشد. پیچ خوردگی یاله‌شدنگی رشته‌های ماهیچه‌ای ممکن است باعث پاره‌شدنگی یا کبودی شود. به وسیله کمپرسهای گرم و سرد، عضو را درمان کرده و سپس قسمت آسیب‌دیده را با یک لفافه شل بانداز کنید.



۱ - فوراً بعد از تصادف کمپرس سودی را با استفاده از تکه‌ای کتان تمیز که در آب سرد خیس خورده روی عضو مجروح قرار دهید.



۲ - هر سی دقیقه کمپرس سرد را عوض کنید. بعد از چند ساعت آن را به کمپرس گرم تغییر دهید. (گرمای آب را به وسیله پشت دست خود امتحان کنید تا گرمای آن قابل تحمل باشد).

پوست و مو

مشکلات مربوط به پوست و مو

اگزما

نواع زیادی مشکل پوستی وجود دارند که تحت این عنوان دسته‌بندی می‌شوند.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا جیره غذایی گربه متنوع است؟ در غیر این صورت ممکن است

کمبود ویتامین داشته باشد.

- آیا مشکل در فواصل زمانی معینی تکرار می‌شود؟ ممکن است گربه شما به آرژی (حساسیت) مبتلا شده باشد.
- آیا عوارضی چون نمدی شدن، ریزش مو، پوسته پوسته شدن، قرمزی، کورک یا زخمهای ترشح دار در سطح پوست یا مو دیده می‌شود؟ در این صورت ممکن است حیوان به بیماری پوستی مبتلا شده باشد.
- آیا در لابلای مو انگلهایی مانند کک وجود دارد؟
- آیا گربه اخته شده است؟ در این صورت ممکن است به کمبود هورمونی دچار شده باشد؟

دلایل احتمالی

- کمبودهای غذایی؛
- حساسیت؛
- هجوم میکروب؛
- عفونت انگلی؛
- تغییر هورمونی.

درمان

موهای نمدی شده را کوتاه کنید. این عمل را بدقت انجام دهید تا پوست گربه را تبرید. گربه را با ماده ضد عفونی کننده ضعیفی شستشو دهید، سپس آن را خشک کنید. از کرم Cetrimide استفاده کنید.

حالت اورژانس

سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید.

ریزش مو

اگر تکه‌هایی از موی گربه در فصلی غیر از فصل موریزی دچار ریزش شد، مشکلی برای سلامتی گربه پیش آمده است.

موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید

- آیا پوست گربه قرمز، شکننده یا ناهموار و زیر شده است؟ در این صورت، گربه ممکن است به بیماریهای قارچی مبتلا شده باشد.
- آیا شما قادر به دیدن حشرات یا ذرات کوچک سیاه‌رنگ شبیه به دوده که ناشی از فضولات کک است در روی موی گربه می‌باشید؟
- آیا جیره غذایی گربه متنوع است؟ در غیر این صورت ممکن است حیوان به کمبود ویتامین دچار شده باشد.

دلایل احتمالی

- بیماری قارچی پوست؛
- انگلهای خارجی؛
- کمبود ویتامین.

درمان

در صورت ابتلا، پوست گربه را با ماده ضد عفونی کننده ضعیفی شستشو دهید، سپس از پارافین مایع استفاده نمایید. برای انگلها از پودر مخصوص استفاده کنید. اگر لازم است جیره غذایی گربه را اصلاح نمایید.

حالت اورژانس

سر فرصت با دامپزشک تماس بگیرید.

عوارض پوست و مو

دو نوع عمده از بیماریهای پوستی وجود دارد: نوع انگلی و غیرانگلی. هر دو نوع در میان گربه‌ها متداول می‌باشد و باید در هنگام شانه کردن گربه به آنها توجه نمایید.

عوارض انگلهای خارجی

آلودگی به کک

گربه به کک مخصوص گربه‌سانان، سگ و انسان آلوده می‌شود. وجود هر یک از این عوامل باعث می‌شود گربه دیوانه‌وار خودش را بخاراند، تکان دهد یا بلیسد. هر جایی که ککها وجود دارند، در موی گربه نقاط سیاه‌رنگی شبیه به دوده

یافت می‌شود. این ذرات فضله کک می‌باشند. در این حالت جوشهای قرمزی که ناحیه مرکزی آنها تیره‌تر است علی‌الخصوص در طول ستون فقرات گربه ایجاد می‌شود، زیرا این ناحیه به پروتئین موجود در بزاق کک حساس است. کهکها ممکن است ناقل لارو کرم نواری باشند. علاوه‌بر این می‌توانند باعث انتشار برخی از بیماریهای ویروسی گردند.

آلودگی به شپش

دو نوع شپش در گربه‌ها وجود دارد: یک نوع آنها خون می‌مکد و نوع دیگر گاز می‌گیرد. متداول‌ترین محل تهاجم شپش، سر گربه است؛ اما آنها می‌توانند در سایر نقاط بدن نیز سکنی گزینند. آلودگی شدید گربه به شپش باعث کمخونی یا آنمی می‌گردد.

آلودگی به کنه

گربه‌هایی که در مناطق روستایی ساکن هستند، ممکن است به کنه گوسفند مبتلا شوند. این انگلها پس از مکیدن خون باد کرده و شبیه یک کشمش سیاه می‌شوند. شما ممکن است آنها را با تومور یا کیست اشتباه بگیرید. در صورتی که قسمتهای دهانی آنها بطور محکم در پوست فرو رفته باشد، به اطراف حرکت نمی‌کنند. به این دلیل اگر شما بخواهید آنها را بکنید، قسمت دهانی آنها در پوست باقی مانده و باعث آبse می‌گردد.

آلودگی به جرب

این موجودات ریز، تونلهایی در پوست گربه ایجاد نموده و باعث التهاب مزمن،

ریزش مو و خارش می‌شوند. متداولترین نوع جرب Notoedres است که نواحی گوش و سر را متأثر کرده باعث طاسی، پوسته‌پوسته شدن و آماس پوست می‌گردد.

آلودگی به سایر جربه‌ها

در فصل پاییز، جربه‌ای خرمان (Chiggers) باعث خارش و آماس پوست گربه می‌شوند و جرب مو که می‌تواند انسان را نیز مانند حیوانات خانگی متأثر کند باعث شوره شدید در پوست می‌گردد.

درمان آلودگی

دستورات دامپزشک را که بهترین راه درمان کک و کنه را به شما توصیه می‌کند به کار گیرید. انواع مناسبی از مواد ضدانگل در بازار موجود می‌باشد. کنه‌ها را با استفاده از قطره کلروفورم بردارید. ابتدا صبر کنید تا قسمتهای دهانی آنها آزاد شود، سپس آنها را با استفاده از موچین از سطح پوست جدا کنید. پس از برداشت کنه باید گربه را با استفاده از مواد ضدانگل مناسب درمان کنید.

عفونتهای قارچی پوست

این عارضه، به وسیله قارچهای Microsporum یا Trichophytes ایجاد می‌شود. این عارضه پوستی، تشکیل نواحی گرد و کوچکی را می‌دهد که دارای مراکز بی مو و حاشیه‌های پوسته‌پوسته می‌باشند. بعد از آزمایش، بیماری با آنتی‌بیوتیکی که از طریق خوراکی داده می‌شود یا به وسیله محلول ضدقارچ یا شستشوی ناحیه آلوده درمان می‌شود.

بیماریهای غیرانگلی

التهاب پوست و زخم‌های ملتهب می‌توانند ناشی از: ۱ - عفونت باکتریایی؛ ۲ - حساسیت غذایی؛ ۳ - تماس با مواد شیمیایی سوزاننده؛ ۴ - آفتاب سوختگی؛ ۵ - کمبود ویتامین؛ و ۶ - اختلالات هورمونی باشد.

درمان بیماریهای غیرانگلی

بدون مشورت با دامپزشک هیچ پمادی را به کار نبرید، زیرا ممکن است گربه آن را بلیسد و باعث بیماری در آن گردد. به جای کوتاه کردن مو در این نواحی، پوست را با آب گرم و مواد ضد عفونی کننده ضعیف تمیز کنید و بدقت آن را خشک نمایید. سپس با دامپزشک تماس بگیرید. اگر گربه نواحی از بدنش رالیس می‌زند یا گاز می‌گیرد، از گردن‌بند الیزابت استفاده کنید. برای ساختن گردن‌بند الیزابت، دایره‌ای ناقص (غیرکامل) از مقوا ببرید، آن را دور گردن گربه قرار دهید و به وسیله نوار چسب به هم بچسبانید (به تصویر توجه کنید).

پیشگیری از آلودگی انسان

انسانها نیز در معرض عفونت قارچی پوست و تعدادی از انواع جریبها می‌باشند. بنابراین مطمئن شوید که عفونت از گربه به افراد خانواده شما منتقل نمی‌شود. محل خواب گربه و بستر دفع ادرار و مدفوع آن را بسوزانید و وسایل مورد استفاده حیوان مانند جعبه‌ها و ظروف را در ماده ضد عفونی کننده داغ و مطمئن استریل

کنید.

کک و شپش گربه ممکن است شما را گاز بگیرند، اما آنها قادر به ادامه حیات روی بدن شما نیستند؛ بنابراین اقداماتی به منظور پیشگیری لازم نیست.

پرستاری از گربه مريض

طريقة بلند کردن گربه مريض

اگر گربه درد دارد یا سراسیمه و آشفته است، یک دست ناحیه پس گردن آن را محکم گرفته و دست دیگر خود را زیر ناحیه عقبی بدنش قرار دهید. آن را داخل یک پتو بپیچید و در یک سبد مخصوص حمل و نقل قرار دهید. یک گربه آرام را می‌توان به وسیله بغل گرفتن آن نیز منتقل کرد.

معاینه گربه ناآرام یا عصبی

روشهای متفاوتی جهت آماده کردن گربه مضطرب و عصبی برای معاینه وجود دارد و این روشها بستگی به شکل معاینه و وضعیت حیوان دارند. در عوارض شدید، دامپزشک مجبور به دادن داروهای آرامبخش می‌باشد. در همه موارد، دامپزشک گربه را با کمک شما یا پرستارش معاینه می‌کند. شما ممکن است متوجه این نکته شوید که پیچیدن گربه در یک پتو آن را آرام می‌کند و درنتیجه

دامپزشک در موقع معاينة آن با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. دامپزشک ممکن است ترجیح دهد هنگام معاينه دست و پای گربه را محکم نگه دارد.



نحوه معاينه سر گربه :


گربه را در حالیکه سرش بیرون است داخل پتو یا پارچه‌ای بسپیجید. این کار برای دامپزشک این امکان را فراهم می‌آورد که ناحیه گوش، چشم و بینی گربه را معاينه کند.



جلوگیری از چنگ زدن گربه :

گربه در حالیکه دست و پاهایش به وسیله کمک دامپزشک گرفته شده است روی میز درازکش قرار می‌گیرد. گربه در این حالت نمی‌تواند به کسی صدمه بزند.


طریقه انتقال گربه آرام یا بیهوش



گربه را به بغل بخوابانید.
سپس دستهایتان را زیر قفسه
سینه و لگن آن قرار دهید و آن
را بلند کنید.

طریقه قرص دادن به گربه

عموماً برای این کار دو نفر لازم است؛ یک نفر باکشیدن پوست پس گردن گربه
به سمت پایین آن را مهار کرده و نفر بعدی به عنوان قرص دهنده عمل می‌کند.
برای قرص دادن می‌توانید از انگشتانتان، انتهای غیر تیز مداد یا قرص خوران
استفاده کنید. آغشته کردن قرص باکره عبور آن را آسان می‌کند.
وقتی شما قرص را در گلوی گربه انداختید دهانش را ببندید و گلویش را ماساژ
دهید تا قرص را ببلعد.



۲ - با انگشت نشانه دست دیگر فک پایینی را به سمت پایین حرکت دهید. قرص را به سمت عقب، در ناحیه میانی بیندازید. بسرعت قرص را به سمت عقب زبان حرکت دهید.

۱ - با انگشت شست و بقیه انگشتها سرگربه را در قسمتی که فکها با هم در تماس هستند بگیرید. انگشت شست و سایر انگشتان را به سمت هم فشار دهید.

خوراندن مایعات با قاشق به گربه

پس گردن گربه را بگیرید. دستان را بپیچانید، آنچنانکه سرگربه به سمت عقب آمده و دهانش باز شود. سپس قاشق محتوی مایع را وارد دهان گربه کرده و قطره قطره آن را خالی کنید، آنچنانکه گربه قادر به حرکت زیانش به سمت عقب باشد.



روش صحیح خوراندن مایعات:
بعد از هر ۲-۳ قطره، به گربه
اجازه دهید آنها را ببلعد، و گونه
گربه سرفه خواهد کرد.

زئونوز‌ها (بیماریهای مشترک)

این کلمه، به معنی بیماریهایی است که می‌توانند از حیوان به انسان منتقل شوند. مراجعه کنندگان اغلب در مورد اینکه آیا سرماخوردگی می‌تواند از گربه به آنها منتقل شود سؤال می‌کنند که پاسخ این سؤال منفی است، اگر چه بیماریهای عفونی دیگری وجود دارند که می‌توانند از گربه به انسان منتقل شوند. تعداد کمی از بیماریهای گربه به عنوان زئونوز شناخته شده‌اند و می‌توانند انسان را تحت تأثیر قرار دهند. این بیماریها شامل هاری، انگل‌های پوستی و توکسوپلاسموز می‌باشند، اما برای جلوگیری از عفونت راههایی وجود دارد:

- همیشه بعد از لمس کردن حیوان خانگی دستتان را بشویید؛
- به زنهای حامله و بچه‌های کوچک اجازه دست زدن به مدفوع گربه را ندهید؛

- بستر گربه را پوشیده نگهدارید؛
- زخمهای حاصل از خراش و گازگرفتگی را با ماده ضد عفونی کننده تمیز کنید.
- اگر درد یا تورم پیشرفت کرد، دنبال مراقبتهای پزشکی باشید، زیرا زخمهای عفونی می‌توانند منجر به تب حاصل از خراشیدگی شوند؛
- گربه مبتلا به کچلی را در قرنطینه و اتاق جدا نگهدارید.

توكسوبلاسموز و راههای پیشگیری از آن

این بیماری، به وسیله تکیاخته‌ای به وجود می‌آید که توكسوبلاسمماگونده‌ای نامیده می‌شود و میزبان طبیعی آن گربه است. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که گربه تنها حیوانی است که انگل توكسوبلاسم را در مدفوعش دفع می‌کند. اگر غذای گوسفند با این مدفوع آلوده گردد می‌تواند در گوسفند هم ایجاد توكسوبلاسموز نماید.

علاجم

در گربه جوان، توكسوبلاسمماگونده‌ای باعث بیماری تنفسی حاد می‌گردد، اما در گربه‌های بالغ ایجاد علاجم مغزی می‌کند که شامل تلوتلو خوردن و کاهش تعادل گربه می‌باشد.

درمان

درمان مشخصی برای آن وجود ندارد و از آنجایی که بیماری می‌تواند به انسان

منتقل شود، گشتن گربه باید مد نظر قرار گیرد.

رعايت نکات بهداشتی کاملاً ضروری و بسیار مهم می باشد

- از داروی ضدعفونی کننده برای تمیز کردن محل توالت گربه و نواحی مجاور استفاده کنید؛
- روزانه بستر گربه را تعویض کنید؛
- در هنگام تعویض بستر از دستکش پلاستیکی استفاده کنید (خصوصاً اگر باردار هستید)؛
- تمام غذاها را به صورت پخته به گربه بدهید؛
- به منظور اجتناب از تماس با خاک و گل آلوده، از دستکش مخصوص باغچه استفاده کنید.

هاری

عامل هاری، ویروس کشنده‌ای است که به وسیله بzac حیوانات آلوده منتقل می‌شود. بیماری در اکثر کشورهای بحالت بومی وجود دارد. در بعضی از کشورها که عاری از این بیماری می‌باشند، قوانین سختی برای جلوگیری از انتشار هاری وجود دارد و حیوانات خارجی را قبل از ورود به کشور در قرنطینه مورد آزمایش قرار می‌دهند. در کشورهایی که چنین قوانینی برای پیشگیری از هاری وجود ندارد، نکات احتیاطی زیر را رعایت کنید:

- ۱ - از نزیک شدن و تماس با حیوانات ولگرد خودداری کنید؛
- ۲ - به حیوان خانگیتان اجازه تماس با حیوانات وحشی را ندهید؛

۳ - واکسن‌های گربه را بطور منظم بزنید.

موارد اورژانس

- اگر توسط گربه‌ای که نسبت به هار بودن آن مشکوک هستید مجروح شدید:
- ۱ - فوراً زخم را به وسیله صابون یا مواد ضد عفونی کننده بشویید. اگر چنین موادی در دسترس نبود ناحیه مربوطه را با آب تمیز یا الکل بشویید.
 - ۲ - فوراً مراقبتهای پزشکی را رعایت کنید. سعی کنید واکسن هاری که زندگی شما را نجات می‌دهد به شما تزریق شود.
 - ۳ - در صورت امکان حیوان را معاینه و در مکانی محدود نمایید، اما مواظب باشید دوباره شما را مجروح نکند.
 - ۴ - اگر قادر به گرفتن گربه نبودید، از مراجع ذیصلاح کسب نظر نمایید.

دوره کمون

ویروس هاری دوره کمون طولانی دارد. دوره کمون آن معمولاً بین ۱۰-۱۲۰ روز می‌باشد، اما گاهی اوقات تا شش ماه هم طول می‌کشد. سیستم قرنطینه، روش خوبی برای حفظ سلامت انسانها و حیوانات می‌باشد. برای جلوگیری از هاری، گربه را در برابر آن واکسینه کنید.

۳

کمکهای اولیه

اغلب گفته می‌شود که گربه‌ها نه تا جان دارند. بدن آنها آنقدر انعطاف‌پذیر و قابل ارجاع است که حتی اگر از بلندی بیفتند یا اینکه با اتومبیل تصادف کنند، کمتر دچار شکستگی یا صدمات جدی خواهند شد. با اینحال، آنها همیشه از تصادفات جان سالم بدر نمی‌برند و بنابراین اطلاع از کمکهای اولیه که در این فصل توضیح داده می‌شود، می‌تواند زندگی گربه‌های مصدوم را نجات دهد.

بیهوشی و تصادف

گربه مصدوم یا بیهوش ممکن است به کمک اولیه نیاز داشته باشد تا از طریق متوقف کردن خونریزی، درمان شوک، تمیز کردن مجاری هوایی آن و دادن تنفس مصنوعی زندگی آن را نجات داد. بنابراین شما باید با اصول کمکهای اولیه آشنا باشید. در صورت امکان، در حین اینکه شما مشغول انجام کمک اولیه هستید، از شخص دیگری بخواهید با دامپزشک تماس بگیرد.

کارهایی که باید از انجام آن خودداری کنید

- هرگز حیوان مصدوم را حرکت ندهید، مگر اینکه در معرض خطر باشد.
به عنوان مثال در خیابان افتاده باشد.
- سر حیوان را بلند نکنید، زیرا بزاق، خون یا مواد استفراغ شده ممکن است به عقب حلق برگشته و باعث انسداد مجاری هوایی گردد.
- به حیوان از طریق دهان مواد خوراکی جامد یا مایع ندهید.

روندها

- ۱ - گربه را از محل خطر دور کنید. اگر مجبور به انتقال گربه بودید، مقوا یا تخته‌ای زیر بدن گربه قرار دهید و آن را مانند برانکارد حمل کنید. ممکن است لازم باشد که ابتدا گربه را مقید کنید. گربه را در جای گرم و آرامی بخوابانید و یک پتو روی آن بیندازید. بطیری آب گرمی را در نزدیکی گربه قرار دهید. مطمئن شوید که بطیری آب گرم باعث سوتگی در گربه نمی‌شود، برای این کار بطیری را در یک تکه پارچه بپیچید.
- ۲ - تعداد ضربان گربه را کنترل کنید: این کار را می‌توانید با قرار دادن دستتان در قسمت داخلی ران گربه، جایی که پا به بدن متصل می‌شود، انجام دهید.
- ۳ - تنفس گربه را کنترل کنید: اگر نفس کشیدن نامنظم است یا اینکه گربه اصلاً نفس نمی‌کشد گردنبند (قلاده) گربه را شل کنید، دهانش را باز کنید، زبانش را به سمت جلو بکشید، هر گونه جسم خارجی را بیرون بیاورید، بزاق، خون و مواد استفراغ شده را پاک کنید و تنفس مصنوعی بدهید.
- ۴ - ضربان قلب گربه را کنترل کنید: این کار را می‌توانید با قرار دادن نوک انگشتتان در پایین قفسه سینه درست در پشت دست گربه انجام دهید. با هر دو دستتان ناحیه بالای قلب گربه را محکم اما بدقت مالش دهید. همچنین تنفس مصنوعی را انجام دهید.
- ۵ - خونریزی را متوقف کنید: هرگونه خونریزی شدید را بند بیاورید.
- ۶ - بررسی کنید آیا استخوانی شکسته است؛ اگر شکسته، درمان اورژانسی انجام دهید (به مبحث بانداز مراجعه کنید).
- ۷ - شوک را درمان کنید: گربه را توسط پتو یا بطیری آب گرم، گرم نگه دارید.
- ۸ - با دامپزشک خود تماس بگیرید و با او قرار ملاقات فوری بگذارید.

دلایل احتمالی از حال رفتن حیوان

- بیماری قلبی؛
- حملات صرع؛
- دیابت (مرض قند)؛
- مسمومیت؛
- مصدوم شدن در اثر تصادف؛
- در معرض آفتاب شدید بودن.

لوازم ضروری کمکهای اولیه

- ۱ - ماده ضد عفونی کننده مناسب؛
- ۲ - شیر منیزیوم؛
- ۳ - مایع شستشوی چشم که در پزشکی نیز مصرف می‌شود؛
- ۴ - پارافین مایع؛
- ۵ - کرم ضد عفونی؛
- ۶ - مایع ضد عفونی؛
- ۷ - قیچی با انتهای گرد؛
- ۸ - موچین؛
- ۹ - دماسنجه با مخزن کوتاه؛

- ۱۰ - پنج تا ده سانتی متر باند؛
- ۱۱ - پنج سانتی متر باند چسبدار؛
- ۱۲ - پنبه؛
- ۱۳ - گوش پاک کن؛
- ۱۴ - گاز استریل؛
- ۱۵ - کیفهای مشمایی برای پوشاندن باندazer.


گرفتن درجه حرارت

اگر حدس می‌زند که گربه شما مريض است، گرفتن درجه حرارت بدن می‌تواند در تشخيص وضعیت حیوان مفید باشد. درجه حرارت طبیعی بدن گربه ۳۸/۶-۳۸/۵ درجه سانتی گراد است، اما می‌تواند مقدار ناچیزی نوسان داشته باشد. اصولاً تا زمانی که درجه حرارت بدن گربه به بالای ۳۹/۲ درجه سانتی گراد نرسیده باشد، گفتن اينکه گربه تب دارد درست نیست.

روش کار


از فرد دیگری بخواهید که گربه را محکم نگه دارد. از یک دماسنجد شيشه‌ای آزمایشگاهی که انتهای آن برآمدگی دارد استفاده کنید. با تکانهای شدید، جیوه آن را به قسمت پایین بیاورید. قسمت برآمده دماسنجد را با پارافین مایع یا روغن گیاهی چرب کنید، دم گربه را بالا بگیرید و با رامی دماسنجد را به اندازه دو سانتی متر

به داخل مقعد گریه وارد کنید. با رامی دماسنج را کج کنید تا قسمت برآمده دماسنج با دیواره راست رو ده گریه در تماس قرار گیرد. حدود یک دقیقه دماسنج را نگه دارید. سپس آن را بیرون بکشید، پاک کنید و درجه حرارت را بخوانید.



روش نگهداشتن گربه :

به شخصی که به شما کمک می کند بگویید که پوست پس گردن گریه را با یک دست خود نگه دارد، آنچنانکه شما بتوانید آزادانه دم گریه را بلند کنید و دماسنج را داخل نمایید.



طریقہ خواندن دماسنج :
دمای بدن یک گربه سالم $38/6$ درجه سانتی گراد است.

روش گرفتن نبض گربه


اکثر گربه‌ها در حالت استراحت دارای ۱۱۰-۱۴۰ نبض در دقیقه می‌باشند. شما می‌توانید نبض گربه را با قرار دادن دستتان در کشاله ران گربه احساس کنید و تعداد آن را بشمارید. نبض باید قوی و منظم باشد. برای یافتن نبض، دستتان را در طول ران حرکت دهید، جایی که پا به بدن متصل می‌شود شما قادر به احساس نبض خواهید بود.



تنفس مصنوعی

چنانچه گربه بیهوش نیست یا اینکه نواحی پشت و اندامهای عقبی آن آسیب ندیده‌اند، بهترین کار این است که عمل تنفس مصنوعی را با تاب دادن گربه آغاز کنید. این کار باعث تمیز شدن مجاري هوایی از مخاط و مایعات می‌گردد. اگر این کار امکان‌پذیر نیست، ممکن است به این نتیجه برسید که انجام عمل تنفس مصنوعی از راه قفسه سینه راحتتر است. اگر گربه بیهوش است یا اینکه شما حدس می‌زنید قفسه سینه آسیب دیده‌است، روش تنفس دهان به دهان بهتر است. در هر دو روش، گربه را حین انجام کار به حالت افقی بخوابانید.

روش خارجی (انجام تنفس مصنوعی از طریق قفسه سینه)



کف هر دو دستتان را روی قفسه سینه و دندنهای قرار دهید و آن را محکم به سمت پایین فشار دهید تا مواد از ریه‌ها خارج شود. مراقب باشید فشار بیش از حد نباشد، زیرا ممکن است باعث شکستگی دندنهای شود. فشار را تقلیل دهید تا ریه‌ها منبسط شوند. هر پنج ثانیه یک بار این عمل را تکرار کنید.



روش دهان به دهان

مجاری هوایی را از لحاظ تمیزبودن بررسی کنید. سپس لبها یتان را نزدیک به سوراخ بینی گربه قرار دهید. و به مدت سه ثانیه در آن بدمید. به مدت دو ثانیه عمل را متوقف کرده سپس دوباره عمل را تکرار کنید.

تشنج

بیشتر تشنجها با رفتارهای نامشخص و نامأتوسی شروع می‌شوند که شامل نشخوار کردن، جویدن، کف کردن دهان، تکان دادن دستها و پاهای، عدم کنترل ادرار و از حال رفتن می‌باشد. این علایم درنهایت منجر به از هوش رفتن گربه می‌گردند.

دوند کار

- ۱ - فوراً با دامپیزشک تماس پذیرید؛
- ۲ - مطمئن شوید که گربه در جای امنی قرار دارد؛
- ۳ - گربه را به حال خود رها کنید، اما وسائل آسایش گربه را مهیا نمایید؛ برای مثال گردنbinد گربه را شل کنید و گربه را با پتویی بپوشانید تا گرم بماند. وقتی

این کارها را انجام می‌دهید، سعی کنید تا هنگام برقراری شرایط مذکور به گربه دست نزنید؛

- ۴ - محركهای خارجی را کاهش دهید. برای این منظور، نور اتاق را کم کنید، پرده‌ها را بکشید و رادیو و تلویزیون را خاموش کنید؛
- ۵ - تشنج نباید بیش از پنج دقیقه طول بکشد. اگر بیشتر طول کشید، کف دهان گربه را پاک کنید و ادرار و مدفوع گربه را نیز تمیز نمایید؛
- ۶ - تا رسیدن دامپزشک، گربه را در یک اتاق گرم و ساکت تگهدارید.

وجود جسم خارجی در دهان

گربه را محکم بگیرید. دهانش را باز کنید. فک پایین آن را با یک مداد به سمت پایین هل دهید. محل شیء را مشخص کنید. اگر لازم است از یک چراغ قوه استفاده کنید. با انگشت یا انبرک جسم را خارج کنید. اگر قادر به بیرون آوردن شیء نبودید، از روش تاب دادن استفاده کنید. حالا با دامپزشک تماس بگیرید.



نجات گربه غرق شده:

برای این کار، پاهای عقبی گربه را بگیرید و آن را بارها و بارها بچرخانید، آنچنانکه نیروی گریز از مرکز آبی را که راههای هوایی را مسدود کرده است خارج کند.

وجود جسم خارجی در چشم

اجازه ندهید گربه به چشمش چنگ بزند. گربه را محکم بگیرید. پلکهایش را باز کنید و چشم آن را معاینه کنید. اگر جسم خارجی در سطح چشم فرو رفته است، سعی در خارج کردن آن ننمایید. مستقیماً سراغ دامپزشک بروید. اگر شیء در چشم فرو نرفته است، ۱-۳ قطره روغن زیتون در چشم گربه بریزید و سپس با دامپزشک تماس بگیرید.

وجود جسم خارجی در بینی

سعی در خارج کردن شیء ننمایید. ابتدا برای کنترل خونریزی و تسکین سوزش از یک کمپرس آب سرد استفاده کنید، سپس با دامپزشک تماس بگیرید.

مسومیت

گربه در معرض مسمومیت با چندین نوع سم قرار دارد. سموم از دو راه اصلی جذب می‌شوند: اولاً، وقتی موی گربه با مواد شیمیایی آلوده شود گربه سعی در

تمیز کردن بدنش می‌نماید و از طریق لیسیدن بدنش مسموم می‌گردد. ثانیاً، از طریق خوردن سمومی که برای کشتن آفات به کار می‌رود یا به وسیله خوردن حیواناتی که توسط سموم کشته شده‌اند مسموم می‌گردد. سعی نکنید از اثرات سم به نوع آن پی ببرید، زیرا انواع مختلفی از سموم اثرات مشابهی ایجاد می‌کنند.

روند کار

- ۱ - با دامپزشک تماس پگیرید و قرار ملاقاتی برای معاینه فوری گربه ترتیب دهید؛
- ۲ - گربه را شستشو دهید. برای این منظور از شامپوی انسانی یا هر نوع صابونی می‌توانید استفاده کنید. سپس گربه را کاملاً با آب بشویید و دقیقاً خشک کنید؛
- ۳ - ملاقات با دامپزشک؛ اگر شما حدس می‌زنید که ماده‌ای شیمیایی مسبب مسمومیت است، نمونه‌ای از ماده شیمیایی و جای آن را همراه با گربه نزد دامپزشک ببرید.

درمان

در صورت لزوم و یا با توجه به توصیه‌های دامپزشک، به منظور ایجاد استفراغ از یک ماده قی آور استفاده نمایید. جهت حفاظت از معده و روده، از ترکیبات محافظ استفاده شود یا اینکه ترکیبات مسهل تجویز گردد.

مواد تهوع‌آور مناسب

- ۱ - تکه‌های کوچکی از کربنات سدیم که به صورت قرص به گریه داده می‌شود؛
- ۲ - محلول کاملاً اشباعی از آب نمک؛
- ۳ - خردل حل شده در آب.

مواد محافظ مناسب

- ۱ - شیر؛
- ۲ - سفیده تخمرغ خام؛
- ۳ - شیر منیزیم؛
- ۴ - روغن زیتون.

مواد مسهل مناسب

- ۱ - پارافین مایع؛
- ۲ - سولفات منیزیم.

جراحات و سوختگیها

مهتمترین عامل جراحات، گازگرفتگی یا خراشیده شدن توسط سایر

گربه‌هاست. اگر شما متوجه وجود خون روی پوست گربه شدید ولی قادر به تعیین منشأ آن نبودید، انگشتان را داخل موی گربه حرکت دهید تا محل جراحت را باید.

روند کار

- ۱ - ناحیه مربوطه را تمیز کنید. اگر لازم است موهای ناحیه اطراف جراحت را کوتاه کنید؛
- ۲ - خونریزی را کنترل نمایید. برای این کار زخم را بانداز کنید؛
- ۳ - شوک را معالجه نمایید. به وسیله پتو یا بطربی آب گرم، گربه را گرم نگه دارید؛
- ۴ - با دامپزشک تماس بگیرید و هر چه سریعتر قرار ملاقاتی را تعیین نمایید.

نکاتی که برای کنترل خونریزی می‌توان از آنها کمک گرفت

- برای جلوگیری از خونریزی دم، می‌توانید روی سرخرگی که در قسمت زیرین دم قرار دارد فشار وارد کنید؛
- برای جلوگیری از خونریزی در پاهای، روی سرخرگی که در قسمت داخلی ران قرار دارد فشار دهید؛
- برای جلوگیری از خونریزی دستها، روی سرخرگی که در سانتی‌متر بالای مفصل آرنج و در سطح داخلی قرار دارد فشار دهید؛
- برای جلوگیری از خونریزی در ناحیه سر و گردن، روی سرخرگی که در شیاری در ناحیه پایینی گردن در محل اتصال گردن با شانه قرار دارد فشار دهید.

درمان سوختگیها

سوختگی، معمولاً در اثر ریختن مایعات داغ روی گربه حادث می‌شود.

علاوه بر این، سوختگی ممکن است شیمیایی، ناشی از سرمای شدید یا الکتریکی باشد. در ناحیه سوختگی، آب سرد یا تکه‌ای یخ قرار دهد. اگر سوختگی از نوع شیمیایی باشد، ناحیه مربوطه را با مقدار زیادی آب بشویید. سپس از پمادهای روغنی مانند مواد ژلاتینی نفتی در محل سوختگی استفاده کنید. آنگاه با دامپزشک تماس بگیرید.

گریه‌های سفید معمولاً از آفتاب‌سوختگی در ناحیه گوشها خود رنج می‌برند. از دامپزشکتان بخواهید پمادهای ضدآفتاب سوختگی را به شما معرفی کند. علاوه بر این گریه را در روزهای آفتابی در خانه نگهدارید.


جراحات متداول

| میزان فوریت | عمل اورژانسی (فوری) | نوع |
|--|---|--|
| ممکن است در خانه درمان شود | محل را با مواد ضد عفونی کننده رقیق بشویید، از کمپرس آب سرد استفاده نمایید، باند نیز به کار ببرید. | زخمهای کوچک بدون خونریزی یا با خونریزی اندک |
| وقت را تلف نکنید فوراً بادام پزشک تماس بگیرید. | خونریزی را کنترل کنید، با مواد ضد عفونی کننده رقیق محل را بشویید، از باند کشی استفاده کنید. | زخمهایی که خونریزی می‌کنند |
| وقت را تلف نکنید فوراً بادام پزشک تماس بگیرید. | محل را با ضد عفونی کننده پودری شکل تمیز کنید، موها را کوتاه نمایید، از باندهای کشی استفاده کنید. | زخمهای عمیق یا طویل (بیش از دو سانتی‌متر) |
| وقت را تلف نکنید فوراً بادام پزشک تماس بگیرید. | موهای ناحیه مربوطه را کوتاه و با محلول اشباع شده آب نمک بشویید، روی زخم را نپوشانید. | زخمهای عفونی یا زخمهایی که در اثر گارگرفتگی به وجود آمدند. |

بانداز

می‌توانید از باندهای انسانی نیز استفاده کنید. هنگام بانداز کردن، هر دور باید $\frac{2}{3}$ دور قلبی را هم بپوشاند. مراقب باشید باند بیش از حد سفت نباشد؛ این کار موجب قطع جریان خون در قسمت پایینی عضو مربوطه می‌شود.


برای باندازکردن



۲ - تکه پارچه را به وسیله باندی که
توسط سنجاق محکم می‌شود
بیندید.


۱ - ابتدا زخم را با یک تکه پارچه به
ضخامت حداقل یک سانتی‌متر
پوشانید.

بانداز یک چشم گربه




برای این منظور تکه‌ای
پارچه جاذب رطوبت
روی چشم قرار دهید و
آن را توسط باند محکم
کنید. باند را ۲-۴ بار دور
سر بپیچید و در قسمتی
روی آن نوار چسب
بزنید.

بانداژ جراحت ناحیه تنہ گربه




برای این منظور، تکه‌ای پارچه جاذب رطوبت روی زخم قرار دهید و آن را با پارچه کتانی مستطیل شکلی محکم کنید. گوشش‌های پارچه را ببرید و در پشت حیوان به هم گره بزنید.

بانداژ جراحات ناحیه دست و پا



کتان را بین پنجه‌ها وارد کنید، پارچه جاذب رطوبت را با نوار محکم کنید، سپس نواری را در زیر پنجه به حالت حلقه درآورده و آن را از بالای پنجه عبور دهید.

استفاده از آتل



ناحیه مربوطه را با تکه‌ای گاز استریل بپوشانید، سپس دو تکه چوب به عرض $1/5$ سانتی‌متر دو طرف عضو مربوطه قرار دهید و با باند ببندید.

۴

نژادهای گریه

۱- گربه‌های موبلندهای ایرانی

۱-۱- گربه موبلندهای ایرانی

(Black longhair)

مشخصات:

رنگ: از سرتادم مشکی براق یکدست بدون وجود کوچکترین رنگ دیگر.

پوشش: موها بلند و نرم و موهای پشت گردن و سر به صورت سیخ و ایستاده.

بدن: جمع و جور و گرد با پاهای کوتاه.

سر: گرد و پهن، گوشها کوتاه و با فاصله زیاد از هم که بخوبی از مو پوشیده شده،
بینی کوتاه، گونه‌ها پر و پوزه پهن می‌باشد.

چشم: بزرگ، گرد، پهن، دارای رنگ نارنجی یا مسی.

۲- گربه موبلندهای ایرانی با چشمان آبی

(Blue eyed white longhair)

مشخصات:

رنگ: کاملاً سفید بدون لکه یا سایه.

پوشش: موهای سرتاسر بدن بلند، موجدار و ابریشمی.

بدن: جمع و جور، کوتاه و چهارشانه بدون اینکه شکل زمختی داشته باشد.

سر: گرد و پهن، گوشها کوتاه و با فاصله مناسب، بینی کوچک، گونه‌ها پر و پوزه پهن.

چشم: گرد و بزرگ، کاملاً باز و به رنگ آبی.

۳-۱- گربه موبلند سفید ایرانی با چشمان نارنجی

(Orange-eyed white longhair)

مشخصات:

رنگ: کاملاً سفید بدون لکه یا سایه.

پوشش: موهای سرتاسر بدن بلند، موجدار، نرم و ابریشمی.

بدن: جمع و جور و چهار شانه با پاهای کوتاه.

سر: گرد و پهن، گوشها کوتاه با فاصله مناسب و پوشیده از مو، بینی کوتاه با گونه‌های پر و پوزه پهن.

چشم: گرد و بزرگ و باز و کاملاً رنگ نارنجی یا مسی دارد.

۴-۱- گربه موبلند آبی رنگ ایرانی

(Blue persian or blue longhair)

مشخصات:

پوشش: موها بلند و انبوه، به حالت نرم و ابریشمی، هر گونه سایه آبی رنگ مجاز می‌باشد، بدون لکه یا سایه یا موهای سفید.

سر: گرد و پهن با فاصله مناسب بین گوشها، پوزه و بینی کوتاه، گوشها کوچک و مودار.

چشم: نارنجی رنگ یا مسی، بزرگ و گرد، بدون اثری از رنگ سبز. جمع و جور و کوتاه.

بدن: کوتاه و پر بدون پیچ خوردنگی.

۵-۱- گربه موبلند قرمز رنگ ایرانی

(Red self longhair)

مشخصات:

پوشش: موها بلند، انبوه و ابریشمی.

رنگ: کاملاً قرمز بدون لکه‌ای به رنگ دیگر.

دم: کوتاه و پر.

بدن: جمع و جور و دارای پاهای کوتاه.

سر: پهن و گرد، گوشها کوتاه و پرمو، بینی کوتاه و پهن، گونه‌ها کاملاً گرد.

چشم: بزرگ و گرد، به رنگ مسی تیره.

۶-۱- گربه موبلند کرم رنگ ایرانی

(Cream longhair)

مشخصات:

رنگ: از کرم کمرنگ تا متوسط، سرتاسر بدن یکدست بدون سایه یا لکه.

پوشش: دارای موی بلند، انبوه و ابریشمی.

دم: کوتاه و پخش.

بدن: جمع و جور و گرد با پاهای کوتاه.

شكل: سر پهن و گرد، گوشها کوچک، بینی پهن و کوتاه، گونه‌ها کاملاً گرد.

چشم: بزرگ و گرد با رنگ مسی پررنگ یا نارنجی تیره.

۷-۱- گربه موبلنده دودی رنگ ایرانی

(Smoke longhair)

مشخصات:

رنگ: سیاه با سایه‌های نقره‌ای در اطراف بدن، گوشها نقره‌ای رنگ که ممکن است به سفیدی بزند.

پوشش: موها انبوه و بلند با بافت ابریشمی.

سر: بزرگ و گرد، بینی پهن و کوتاه، گوشها کوچک و پرمو با فاصله مناسب، بدن گرد و توپی با پاهای کوتاه که حالت زمختی نداشته باشد.

چشم: مسی یا پرتقالی، بزرگ و گرد.

۸-۱- گربه موبلنده ایرانی با خطوط نقره‌ای

(Silver tabby longhair)

مشخصات:

رنگ: نقره‌ای خالص کمرنگ با خطوط تیره.

سر: پهن و گرد، گوشها کوتاه با فاصله مناسب با پوشش ابریشمی بر روی آن، پوزه پهن، بینی کوتاه.

بدن: گرد و توپی و جمع و جور با پاهای کوتاه.

چشم: بزرگ و گرد به رنگ سبز یا میشی.

پوشش: موها بلند و انبوه و ابریشمی.

دم: کوتاه و پرمو.

۹-۱- گربه موبلند ایرانی دارای خطوط قهوه‌ای (Brown tabby longhair)

مشخصات:

رنگ: کاملاً قهوه‌ای تیره، روی پیشانی دارای ۲-۳ خط مجذب، دو خط نازک روی سینه بطور مجزا عبور کرده و یک علامت پروانه‌شکل روی شانه‌ها وجود دارد، خطهایی در دستها از نوک پنجه‌ها به سمت بالا کشیده شده، در اطراف پهلوها و دم دارای پوشش حلقوی می‌باشد.

پوشش: موبلند و افshan.

دم: کوتاه و پر مو.

بدن: توپی و گرد، دارای پاهای کوتاه.

سر: گرد و پهن، گوشها کوتاه، بینی کوتاه و پهن، گونه‌ها گرد و پر.

چشم: بزرگ و گرد با رنگهای مسی یا پرتفالی (نارنجی).

۱۰-۱- گربه موبلند ایرانی با خطوط قرمز

(Red tabby longhair)

مشخصات:

رنگ: رنگ زمینه قرمز، خطوط و نوارها قرمز پررنگ که بطور واضح آشکار می‌باشد و این خطوط در سینه و پaha و دم ادامه دارد.

پوشش: بلند، انبوه و ابریشمی.

دم: کوتاه و افshan بدون سفیدی در نوک آن.

بدن: محکم، گرد و توپی با پاهای کوتاه.

سو : پهن و گرد، گوشها کوتاه، بینی پهن و کوتاه، گونه‌ها کاملاً گرد و پر
چشم : بزرگ، گرد و مسی رنگ.

۱۱- گربه چین‌چیلای ایرانی

(*Chinchilla longhair*)

مشخصات:

پوشش : ابریشمی، ضخیم و انبوه می‌باشد. پوشش به رنگ سفید برفی بوده تنها در ناحیه پشت، پهلو، دم، گوشها و نوک موها سیاه رنگ می‌باشد. ناحیه چانه، قفسه سینه و شکم باید سفید خالص باشد.

سو : پهن و گرد، پوزه پهن، بینی کوتاه و سر بالا، گوشها کوتاه با فاصله مناسب.
بدن : چهار شانه و توپی، پاهای کوتاه.

چشم : بزرگ، گرد، به رنگ سبز زمزدی یا سبز متمایل به آبی.
دم : کوتاه، پهن و پرمو.

۱۲- تورتوایس‌شل موبلنده (مخلوطی از سیاه، قرمز و کرم)

(*Tortoiseshel longhair*)

مشخصات:

رنگ : سه رنگ سیاه، قرمز و کرم که به صورت لکه‌های جداگانه می‌باشد. رنگها باید روشن باشد.

پوشش : موها ابریشمی و بلند و افشاران، ممکن است موهایی دیده شود که از پوشش بدن بلندتر است.

بدن : توپی و چهارشانه با پاهای کوتاه.

سر : گرد و پهن، گوشها کوچک، بینی کوتاه و پهن، گونه پر و گرد.
 چشم : بزرگ، گرد، به رنگ مسی یا نارنجی تیره.

۱۳-۱ - تور توایس شل موبلنده و سفید (Tortoiseshell and white longhair)

مشخصات:
 رنگ : چهار رنگ سیاه، قرمز، کرم و سفید که روی بدن بطور مجزا پخش شده است.

پوشش : موها بلند، انبوه و افسان.
 بدن : توبی و چهار شانه با پاهای کوتاه.
 سر : گرد و پهن، گوشها کوتاه، بینی پهن و کوتاه، گونه گرد و پر.
 چشم : بزرگ، گرد به رنگ مسی یا نارنجی تیره.

۱۴-۱ - گربه موبلنده دورنگ ایرانی (یکی از رنگها سفید) (Bicolour longhair)

مشخصات:
 رنگ : سفید و سیاه، آبی و سفید، نارنجی و سفید، کرم و سفید، قرمز و سفید، در لکه‌های رنگی، سایه‌های رگه‌دار وجود نداشته باشد.

علائمها : رنگهای سیاه، آبی، نارنجی یا کرم از پشت شانه‌ها به طرف پهلوهای شکم شروع و به دم و لگن و پاهای ختم می‌گردد، اما پنجه‌ها سفید می‌باشد.
 گوشها و صورت رنگ تیره دارند. زیر شانه‌ها، گردن، قسمت جلو رانها و پنجه‌ها، چانه و لب به سفیدی می‌گراید. بنابراین ظاهر این حیوان را

بطور دقیق به دو قسمت تقسیم می‌نماید.

چشم: نارنجی یا کهربایی یا مسی.

بدن: گرد و توپر، پاهای کوتاه.

دم: کوتاه و پرمو.

۱۵-۱ - گربه موبلند آبی - کرم ایرانی

(Blue - cream longhair)

مشخصات:

رنگ: دارای سایه کدر آبی و کرم که به صورت خیلی نرم در هم آمیخته‌اند.

پوشش: متراکم و نرم و ابریشمی.

سر: بزرگ، گرد، گوشها کوچک و ظریف که در جای مناسب قرار دارد. بینی، پهن و کوتاه و در صورت رنگها در هم آمیخته است.

چشم: نارنجی یا مسی تیره.

بدن: کوتاه، توبی و چهار شانه، پاهای کوتاه.

۱۶-۱ - هیمالیایی (خمر) موبلند با لکه رنگی

(Colour point longhair)

مشخصات:

پوشش: باموهای بلند، بافتی نازک و نرم به رنگ شکلاتی یا رنگهای دیگر که در گربه‌های سیامی موجود است مانند کرم و سفید. لکه‌ها به صورت فشرده و سایه‌دار می‌باشند.

سر: بزرگ، گرد و پهن، گوشها کوچک با فاصله معین، صورت و بینی کوچک.

- چشم: بزرگ، گرد و آبی پررنگ.
بدن: گرد و کوتاه و پایین افتاده.
دم: کوتاه، انحنای دم این نزد به عنوان یک نقص یا عیب به شمار می‌رود.

۱۷-۱- گربه برمه‌ای

(Birman)

مشخصات:

- رنگ: به همان رنگ گربه سیامی است، اما دم و پنجه‌ها قهوه‌ای تیره می‌باشد، رنگ پوشش طلایی کمرنگ یا قهوه‌ای روشن مایل به زرد و خاکستری، چنگالها سفید به حالت دستکش می‌باشند.
بدن: کشیده، پاها کوتاه، پنجه‌ها قوی و کوچک.
سر: پهن، گرد، محکم با گونه‌های پر.
پوشش: بلند و متراکم، دم انبوه با بافتی ابریشمی.
چشم: آبی روشن.
دم: افشار و بلند.

۲- گربه‌های موکوتاه

۱-۲- گربه موکوتاه سفید اروپایی با چشمان آبی

(Blue eyed white shorthair)

مشخصات:

مو: کوتاه، با ماهیت خوب.

سر: بین دو گوش عریض، چانه خوب رشد کرده، صورت تقریباً کوتاه.

گوش: متوسط، دارای انتهای گرد و قاعده کم عرض.

دست و پا: متناسب با بدن، پنج انگشت در جلو، چهار انگشت در عقب.

دم: متناسب با بدن، قاعده کلفت و از قاعده تا انتهای بطور ملایم باریک می‌شود.

تنه: کاملاً جمع، باقدرت، سینه پر.

رنگ: کاملاً سفید بدون رگه از رنگهای دیگر.

چشم: گرد، بزرگ، آبی روشن شفاف.

۲-۲- گربه موکوتاه سفید اروپایی با چشمان نارنجی

(Orange eyed white shorthair)

این گربه کاملاً سفید با چشمان نارنجی فقط از نظر رنگ چشمان با نژاد سفید چشم آبی فرق دارد و سایر خصوصیات و استاندارد این نژاد مانند گربه نژاد قبل است.

۳-۲ - گربه موکوتاه سیاه انگلیسی

(British black shorthair)

استاندارد این نژاد مانند گربه نژاد ۱-۲ می‌باشد. به علاوه رنگ پوشش و

چشمان به شرح زیر است:

رنگ: سیاه براق یکدست بدون سفیدی.

چشم: بزرگ، گرد، باز، به رنگ نارنجی تیره یا مسی بدون خطوط سبز.

۴-۲ - گربه موکوتاه آبی انگلیسی

(British blue shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ چشم به شرح زیر است:

چشم: سبز روشن، بادامی شکل که به فاصله مناسب از هم دیگر قرار گرفته‌اند.

۵-۲ - گربه آبی روسی

(Russian blue)

مشخصات:

رنگ: آبی روسی یکدست در سرتاسر بدن، البته آبی متوسط ارجحیت دارد.

پوشش: کوتاه، ظریف، با ایستادگی بسیار خوب، نرم و ابریشمی.

بدن: بدنه کشیده و جالب با استخوان‌بندی تقریباً قوی، دمی بلند و حلقوی.

پاهای: پاهای بلند، پنجه‌ها کوچک و بیضی شکل.

سر : سر به شکل مثلث با پیشانی صاف که به حالت شیب در آمده است. سبیل بزرگ، گوشها بزرگ با سوراخی گشاد در قاعده که به صورت عمود بر روی سر قرار گرفته و پوست گوشها نازک و شفاف می باشد.

چشم : سبز رoshن، باز و بادامی شکل که با فاصله مناسب از هم دیگر قرار گرفته است.

۶-۲- گربه موکوتاه کرم انگلیسی

(British cream shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:

پوشش : کرم کاملاً روشن و یکدست.

چشم : مسی یا میشی.

۷-۲- گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط نقره‌ای

(British silver tabby shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:

پوشش : رنگ زمینه نقره‌ای روشن با خطوط نقره‌ای تیره بدون اینکه با رنگ زمینه مخلوط شده باشد. بدون خالهای سفید.

چشم : گرد، باز به رنگ سبز یا میشی.

۸-۲ - گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط قرمز

(British red tabby shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:

پوشش: خطوط قرمز تیره که با رنگ زمینه مخلوط نشده و نسبت به رنگ زمینه متمایز می‌باشد.

چشم: نارنجی یا میشی.

۹-۲ - گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط قهوه‌ای

(British brown tabby shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:

پوشش: خطوط قهوه‌ای بسیار تیره بدون اینکه با رنگ زمینه مخلوط شده باشد. خطوط با هم دیگر تلاقی پیدا نمی‌کنند. رنگ زمینه در سرتاسر بدن

یکدست و قهوه‌ای روشن بدون لکه‌های سفید می‌باشد.

چشم: نارنجی یا میشی یا زرد تیره یا سبز.

۱۰-۲ - تورتوایس شل موکوتاه انگلیسی (مخلوطی از سیاه، قهوه‌ای، قرمز، کرم)

(British tortoiseshell shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲ به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:

پوشش: سیاه، قهوه‌ای، قرمز، کرم که ممکن است تیره یا روشن باشند و بطور یکنواخت در سرتاسر بدن پخش شده و رنگها باید شفاف و بدون سفیدی، خال و علامتهای مخطط باشد. رنگ قرمز آتشین این نژاد بسیار مورد علاقه است.

۱۱-۲ - گربه انگلیسی تورتوایس‌شل و سفید (British tortoiseshell and white shorthair)

مشخصات:

مانند نژاد ۱-۲، به علاوه رنگ پوشش و چشم به شرح زیر است:
رنگ: قرمز، سیاه، کرم، سفید.

۱۲-۲ - گربه سیامی (Siamese)

مشخصات:

بدن: اندازه متوسط، اندام دراز و باریک، پاهای متناسب و قلمی که پاهای کمی بلندتر از دستها می‌باشند. پنجه‌ها کوچک و بیضی‌شکل، دم دراز و حلقوی و در انتهای باریک.

سر: سر عضلانی و مثلثی‌شکل که به سمت پوزه به شکل جالبی باریک می‌شود. گوشها بزرگ و نوک تیز و در قاعده عریض می‌باشند.

چشم: آبی روشن و براق، به اندازه متوسط و بادامی‌شکل.

رنگ: کرم که به رنگ حنایی سایه می‌زند و در پشت بچه‌گربه‌ها کمرنگتر می‌باشد.

نشانه‌ها: پوشش صورت، گوشها، پاهای پنجه‌ها و دم قهوه‌ای و سیاه یا قهوه‌ای شکلاتی.

پوشش: موها کوتاه با بافتی جالب، شفاف، براق و خوابیده می‌باشد.

۱۳-۲ - گربه سیامی دارای خالهای آبی

(Blue pointed siamese)

مشخصات:

مانند نژاد ۱۲-۲، به علاوه مشخصات زیر می‌باشد:

چشم: آبی شفاف و روشن.

رنگ: بدن باید به رنگ سفید مایل به آبی با نقاط ارغوانی مایل به سیاه باشد.

۱۴-۲ - مانکس یا گربه مغولی

(Manx)

مشخصات:

نداشتن دم، کپل بلند، دارای پشتی با طول کم، دارای تھیگاه عمیق، پوشش باید دارای دو حالت باشد، نرم و با فاصله در بالا مانند خرگوش و نرم و ضخیم در قسمت زیرین، داشتن دنبه به گردی پرتغال ایده‌آل می‌باشد.

۱۵-۲ - گربه مغولی سیاه و سفید

(Red and white manx)

مشخصات:

گوشها: متوسط با نوک گرد

سر: گرد و عریض با بینی مستقیم و کوچک.

چشم: بزرگ، گرد و به رنگ مسی تا نارنجی.

پوشش: پوشش کوتاه و انبوه و باید مخلوطی از رنگهای قرمز و سفید باشد.

پنجه‌ها: بزرگ و گرد و پاهای عقبی بزرگتر می‌باشند و همچنین فاقد دم می‌باشد.

۱۶-۲ - گربه مخطط خالدار اروپایی

(Spotted tabby)

مشخصات:

رنگ زمینه نقره‌ای کمرنگ، خطوط آن تیره‌تر از زمینه که از ستون فقرات به

سمت پایین کشیده می‌شود. خالها به صورت حلقه‌های باریک و بیشمار و کاملاً از

زمینه مجزا می‌باشد. در تمام گربه‌های مخطط دم آنها باید حلقوی باشد.

۱۷-۲ - گربه آبی - کرم انگلیسی

(British blue - cream short hair)

مشخصات:

بدن، حالت، سر و چشمان مانند نژادهای اروپایی است.

چشم: مسی، نارنجی تیره، زرد.

پوشش: کوتاه و انبوه، به صورت مخلوطی از رنگهای آبی و کرم.

۱۸-۲ - گربه قهوه‌ای بلوطی (هاوانا)

(Chestnut brown foreign)

مشخصات:

پوشش: رنگ قهوه‌ای بلوطی یکدست، کوتاه و برآق در سرتاسر بدن.

سر: سری دراز و متناسب که به طرف پوزه به شکل جالبی باریک می‌شود.
گوشها بزرگ با قاعده‌ای عریض و استوار.

بدن: بدنه کشیده، باریک و عضلانی با ظاهری جذاب، پاهای قائمی و قدری بلندتر از دستهای پنجه‌ها بیضی و ظریف با دمی بلند و شلاقی و بدون انحنای.

چشم: رنگ سبز، زاویه‌دار.

۱۹-۲ - رکس آبی - کرم آلمانی

(Blue - cream cornishrex)

مشخصات:

پوشش: در کل بدن انبوه، خیلی کوتاه، دارای موج که در ناحیه سر، پاهای پنجه‌ها انبوه‌تر و با شکوhter جلوه نماید. رنگ بدن مخلوطی از آبی و کرم می‌باشد.

سر: از متوسط تا بزرگ که بطور مناسب به طرف چانه باریک شود. چانه‌ها قوی با جمجمه‌ای پهن، در نیم رخ از وسط پیشانی تا انتهای بینی صاف دیده می‌شود.

چشم: بادامی، متوسط، رنگ چشم همانند پوشش بدن.

گوشها: بزرگ با قاعده عریض و تا بالا حلقوی و کاملاً از مو پوشیده شده باشد.
بدن: کشیده و بلند، محکم و عضلانی در اندازه‌های متوسط، پاهای بلند، پنجه‌ها

کوچک و بیضی شکل، گردنی باریک، دمی بلند مانند شلاق.

۲۰-۲ - رکس آبی انگلیسی

(Blue devon rex)

مشخصات:

پوشش: خیلی کوتاه و انبوه و موجدار اما موج و زبری آن کمتر از کورنیش می باشد.
رنگ بدن باید آبی باشد.

سو: صورتی با گونه های پر، چشمها با فاصله باز و مناسب، سر به طرف پوزه
باریک می شود. موهای صورت ندانه دار، پوزه کوچک، بینی از نیمرخ
قابل تشخیص، پیشانی صاف و از بالا به پایین شیب دارد.

چشم: بزرگ، بدامی شکل، رنگ چشم هماهنگ با رنگ بدن یا سبز یا زرد است.
گوش: بزرگ، در قاعده عریض که تدریجیاً به صورت حلقوی به سمت بالا رفته و
کاملاً از مو پوشیده شده است.

بدن: بلند و کشیده، محکم و عضلانی، اندازه متوسط، پاهای بلند، گردن باریک و
کشیده، پنجه ها کوچک و بیضی شکل.

دم: بلند، به شکل شلاق.

۲۱-۲ - اسفینکس آبی

(Blue sphynx)

مشخصات:

گوشها: خیلی بزرگ با نوک گرد.

چشم: عمی، شیبدار (Slanted) و به رنگ مسی.

سر: مثلثی شکل با بینی کوچک.

پوشش : فاقد مو.

بدن : طویل با دمی بلند.

پاهای : بلند و باریک با پنجه‌های گرد و کوچک.

گربه‌های موبلندر

گربه موبلندر سیاه ایرانی





گربه موبلنده
سفید ایرانی
با چشمان آبی



گربه موبلنده
قرمزرنگ ایرانی



گربه موبلنده
آبی رنگ ایرانی



گربه موبلند کرم رنگ ایرانی



در این تصویر،
گربه موبلند
آبی رنگ ایرانی
را در کنار گربه
کرم رنگ ایرانی
می بینید.




گربه موبلند
دو دی رنگ ایرانی



گربه موبلند سفید ایرانی
با چشم انارنجی

گربه موبلند ایرانی با خطوط نقره‌ای





گربه موبلنڈ ایرانی دارای خطوط قهوه‌ای

گربه موبلنڈ ایرانی با خطوط قرمز





گربه چین‌چیلای ایرانی

گربه موبلنده دو رنگ ایرانی






گربه موبلندر
آبی - کرم
ایرانی



گربه تور توایس شل
موبلندر و سفید



گربه هیمالیایی (خمر) موبلنده با لکه رنگی

گربه برمهای

گربه تورتاوایس شل موبلنده
(مخلوطی از سیاه، قرمز و کرم)



گربه‌های موکوتاه



گربه موکوتاه
سفید اروپایی ←
با چشمان آبی

گربه موکوتاه
سفید اروپایی
با چشمان نارنجی ↓





گربه موکوتاد
سیاه
انگلیسی



گربه موکوتاد
انگلیسی
با خطوط قرمز



گربه موکوتاد انگلیسی
با خطوط نقرای



گربه موکوتاد کرم انگلیسی

گربه تور توایس شل
موکوتاد انگلیسی



گربه آبی روسی





گربه موکوتاه انگلیسی با خطوط قهوه‌ای

گربه قهوه‌ای بلوطی (هاوانا)

گربه موکوتاه آبی انگلیسی





گربه انگلیسی
تور توایس شل
و سفید



گربه سیامی



مانکس یا
گربه مغولی



↑ گربه مغولی قرمز و سفید



← گربه سیامی
با خالهای آبی



گربه مخطط خالدار اروپایی



گربه آبی - کرم انگلیسی



↑ گربه رکس آبی - کرم آلمانی

→ گربه رکس آبی
انگلیسی

گربه اسفینکس آبی



از همین سری منتشر شده است :

